

## جداء وخارج عددين جذريين

### I \_ جداء عددين جذريين:

#### (1) - قاعدة:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \quad \text{و } \frac{c}{d} \text{ و } \frac{a}{b} \text{ عددان جذريان.}$$

#### (2) - قاعدة الإشارات:

نعتبر  $\frac{c}{d}$  و  $\frac{a}{b}$  عددين جذريين.

-- يكون  $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} > 0$  إذا كان للعددين الجذريين  $\frac{a}{b}$  و  $\frac{c}{d}$  نفس الإشارة

-- يكون  $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} < 0$  إذا كان للعددين الجذريين  $\frac{a}{b}$  و  $\frac{c}{d}$  إشارتين مختلفتين

\* أمثلة:

$$\begin{aligned} 3,2 \times \frac{4}{-16} &= \frac{-32}{10} \times \frac{4}{-16} \\ &= \frac{-2}{5} \times \frac{2}{-1} \\ &= \frac{-4}{-5} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{12}{15} \times \frac{5}{-7} &= \frac{12}{3} \times \frac{1}{-7} \\ &= \frac{4}{1} \times \frac{1}{-7} \\ &= \frac{4 \times 1}{1 \times (-7)} \\ &= \frac{4}{-7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{5} \times \frac{-1}{7} &= \frac{2 \times (-1)}{5 \times 7} \\ &= \frac{-2}{35} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{-3}{-16} \times \frac{-10}{18} &= \frac{-1}{-8} \times \frac{-5}{6} \\ &= \frac{5}{-48} \end{aligned}$$

#### (3) - جداء عدد جذري و واحد:

\* قاعدة:

$$\frac{a}{b} \times 1 = 1 \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \quad \text{عدد جذري.}$$

\* أمثلة:

$$1 \times \left(-\frac{5}{7}\right) = -\frac{5}{7} \quad : \quad \frac{5}{-9} \times 1 = \frac{5}{-9} \quad : \quad 1 \times \frac{-7}{5} = \frac{-7}{5} \quad : \quad \frac{11}{8} \times 1 = \frac{11}{8}$$

(4) – جداء عدد جذري و صفر:

\* قاعدة:

$$\frac{a}{b} \times 0 = 0 \times \frac{a}{b} = 0 \quad \text{عدد جذري. } \frac{a}{b}$$

\* أمثلة:

$$\frac{117}{58} \times 0 = 0 \quad : \quad 0 \times \left(-\frac{157}{661}\right) = 0 \quad : \quad \frac{-8}{11} \times 0 = 0$$

(5) – خاصية إضافية:

$$a \times \frac{1}{b} = \frac{1}{b} \times a = \frac{a}{b} \quad \text{و } b \text{ عدنان عشريان نسيان بحيث } : b \neq 0$$

\* مثال:

$$51 \times \frac{1}{-8} = \frac{51}{-8} \quad ; ; \quad \frac{1}{7} \times (-11) = \frac{-11}{7}$$

II \_ جداء ثلاثة أعداد جذرية:

(1) – قاعدة:

$$\begin{aligned} a \times b \times c &= a \times (b \times c) \\ &= (a \times b) \times c \\ &= (a \times c) \times b \end{aligned}$$

*a و b و c أعداد جذرية.*

## (2) – أمثلة:

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{5} \times \frac{-10}{2} \times \frac{1}{7} \\ &= \left( \frac{2}{5} \times \frac{-10}{2} \right) \times \frac{1}{7} \\ &= \left( \frac{1}{1} \times \frac{-2}{1} \right) \times \frac{1}{7} = \frac{-2}{1} \times \frac{1}{7} = \frac{-2}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{3}{2} \times 0,5 \times \frac{1}{5} \\ &= \frac{3}{2} \times \left( \frac{5}{10} \times \frac{1}{5} \right) \\ &= \frac{3}{2} \times \left( \frac{1}{10} \times \frac{1}{1} \right) = \frac{3}{2} \times \frac{1}{10} = \frac{3}{20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 2,5 \times \frac{3}{4} \times 10 \\ &= (2,5 \times 10) \times \frac{3}{4} = \frac{25}{1} \times \frac{3}{4} = \frac{75}{4} \end{aligned}$$

## III\_ خارج عددين جذريين:

### (1) – مقلوب عدد جذري غير منعدم:

\* قاعدة:

$a$  عدد جذري غير منعدم .  
مقلوب العدد  $a$  هو العدد  $\frac{1}{a}$  .  
نرمز له بالرمز  $a^{-1}$  و نكتب :  $a^{-1} = \frac{1}{a}$

\* مثال:

$$\begin{aligned} (-5)^{-1} &= \frac{1}{-5} \\ \left( \frac{-3}{7} \right)^{-1} &= \frac{1}{\frac{-3}{7}} = \frac{7}{-3} \end{aligned}$$

مقلوب العدد الجذري  $-5$  هو :

مقلوب العدد الجذري  $\frac{-3}{7}$  هو :

### (2) – خاصية:

$\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$  عدد جذري غير منعدم .  
 $x \times x^{-1} = 1$  عدد جذري غير منعدم .

\*مثال:

$$\frac{141}{200} \times \left(\frac{141}{200}\right)^{-1} = 1 \quad ; \quad \frac{11}{-8} \times \frac{-8}{11} = 1$$

\* تمرين تطبيقي :

$x$  و  $y$  عددان جذريان غير منعدمين.

$$A = x(x^{-1} + y) + y(x + y^{-1}) \quad \text{نضع :}$$

$$A = 2 + 2xy \quad \text{بين أن :}$$

للمزيد زوروا موقع قلمي

الحل:

لدينا :

$$\begin{aligned} A &= x(x^{-1} + y) + y(x + y^{-1}) \\ &= x \times x^{-1} + x \times y + y \times x + y \times y^{-1} \\ &= 1 + xy + xy + 1 \\ &= 1 + 1 + xy + xy \\ &= 2 + 2xy \end{aligned}$$

(3) - خارج عددين جذريين :

\* قاعدة:

$\frac{a}{b}$  و  $\frac{x}{y}$  عددان جذريان بحيث  $x \neq 0$ .

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{x}{y}} = \frac{a}{b} \times \frac{y}{x} = \frac{ay}{bx}$$

\* تمرين تطبيقي:

أحسب ما يلي مع الاختزال إذا كان ممكنا:

$$\frac{102}{15} \div \frac{-12}{-9} \quad ; \quad \frac{-12}{23} \div \frac{-23}{12} \quad ; \quad \frac{-5}{21} \div \frac{25}{7}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{102}{15} \div \frac{-12}{-9} &= \frac{102}{15} \times \frac{1}{-9} \\ &= \frac{34}{15} \times \frac{1}{-3} = \frac{34}{-45} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{-12}{23} \div \frac{-23}{12} &= \frac{-12}{23} \times \frac{12}{-23} \\ &= \frac{-144}{-529} = \frac{144}{529} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{-5}{21} \div \frac{25}{7} &= \frac{-5}{21} \times \frac{7}{25} \\ &= \frac{-1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{-1}{15} \end{aligned}$$