


الدرس: المستقيمت الموازية لأضلاع مثلث



الامتدادات	القدرات المستهدفة	المكتسبات القبلية
<p style="text-align: center;">- مبرهنة طاليس - المستقيمت الهامة في المثلث</p>	<p>- معرفة واستعمال المبرهنات التالية : * في مثلث المستقيم المار من منتصف ضلعين يوازي حامل الضلع الثالث* * طول القطعة التي تربط منتصف ضلعين يساوي نصف طول الضلع الثالث* * المستقيم المار من منتصف أحد أضلاع مثلث و الموازي لحامل الضلع الثاني يقطع الضلع الثالث في منتصفه. - استعمال المبرهنة التالية : إذا كان ABC في مثلث و $(AB) \parallel (BC)$ و $N \in [AC]$ و $M \in [AB]$ فإن : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ -تقسيم قطعة إلى قطع متقايسة</p>	<p>- خاصيات متوازي الأضلاع -خصائص التوازي والتعامد - مساحة مثلث - تساوي الأعداد الجذرية - حل معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد</p>


مضامين الدرس وهيكله



- 1- المستقيم المار من منتصف ضلعي مثلث
- 2- المستقيم المار من منتصف أحد أضلاع مثلث و الموازي لحامل الضلع الثاني
- 3- المستقيم الموازي لضلع في مثلث
- 4- تقسيم قطعة إلى قطع متقايسة

الوسائل اليداكتيكية : الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشير -
المسطرة – الكوس – البركار

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p>نشاط</p> <p>A و B و C نقط غير مستقيمة و O منتصف [AC]</p> <p>1- أنشئ D مماثلة B بالنسبة للنقطة O .</p> <p>2- بين أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع .</p>	<p>أنشطة تشخيصية</p>
المدة: 20 دقائق	<p>نشاط</p> <p>ABC مثلث</p> <p>1-أ- أرسم المثلث ABC بحيث I منتصف [AB] و J منتصف [AC]</p> <p>ب- ماذا يمكن أن نقول عن المستقيمين (IJ) و (HE) ؟</p> <p>ج- بواسطة المسطرة أعط قياس IJ ؟</p> <p>2-أ- أنشئ النقطة K مماثلة I بالنسبة ل J</p> <p>ب- بين أن الرباعي AKCI متوازي الأضلاع ,</p> <p>ج- بين أن الرباعي IKCB متوازي الأضلاع ؟</p> <p>ت- استنتج أن المستقيمين (IJ) و (BC) متوازيين .</p> <p>د- بين أن $IJ = \frac{1}{2} BC$</p>	<p>أنشطة بنائية</p>
المدة: 10 دقائق	<p>1- المستقيم المار من منتصف ضلعي مثلث خاصية</p> <p>- المستقيم المار من منتصف ضلعي مثلث يوازي حامل الضلع الثالث</p> <p>- طول القطعة التي طرفيها منتصف ضلعي مثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث</p>	<p>ملخص الدروس</p>
	<p>مثال</p>  <p>ABC مثلث لدينا N منتصف [AC] و M منتصف [AB]</p> <p>إذن: $(MN) // (BC)$ و $MN = \frac{1}{2} BC$</p>	
	<p>تمرين تطبيقي</p> <p>ABC مثلث بحيث : $BC = 5 \text{ cm}$ و D مماثلة A بالنسبة للنقطة B</p> <p>E مماثلة A بالنسبة للنقطة C</p> <p>1- أنشئ الشكل</p> <p>2- بين أن (BC) يوازي (DE)</p> <p>3- أحسب DE</p>	<p>أنشطة تقويمية</p>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p>نشاط</p>  <p>من بين الأشكال التالية أين يمكن أن نقول أن (AB) يوازي (TM) علل جوابك؟</p>	<p>أنشطة تشخيصية</p>
المدة: 20 دقائق	<p>نشاط</p> <p>ABC مثلث و M منتصف $[AB]$ (Δ) مستقيم يمر من M و يوازي (BC) و يقطع $[AC]$ في N لتكن K منتصف $[AC]$ بين أن K منطبقة مع N</p>	<p>أنشطة بنائية</p>
المدة: 10 دقائق	<p>2- المستقيم المار من منتصف أحد أضلاع مثلث و الموازي لحامل الضلع الثاني</p> <p>خاصية</p> <p>المستقيم المار من منتصف ضلع مثلث و الموازي لضلع آخر في هذا المثلث يمر من منتصف الضلع الثالث</p> <p>مثال</p>  <p>لدينا ABC مثلث بحيث M منتصف القطعة $[AB]$, الموازي ل (BC) و المار من M يقطع $[AC]$ في N إذن N منتصف $[AC]$</p>	<p>ملخص الدروس</p>
المدة: 15 دقائق	<p>تمرين تطبيقي</p> <p>تمرين 13 صفحة 134 (كتاب المسار)</p>	<p>أنشطة تقويمية</p>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p>نشاط</p> <p>أوجد قيمة العدد الجذري x في كل حالة من الحالات الآتية :</p> $\frac{5}{8} = \frac{x}{3} \quad " \quad \frac{x}{7} = \frac{5}{6} \quad " \quad \frac{1}{x} = \frac{5}{6}$	<p>أنشطة تشخيصية</p>
المدة: 20 دقائق	<p>نشاط</p> <p>في الشكل أسفله، النقطة M تنتمي للقطعة $[AB]$، N تنتمي للقطعة $[AC]$ و $(MN) \parallel (BC)$.</p> <p>1- قم بقياس أطوال الأضلاع $[AM]$ و $[AB]$، أعط قيمة $\frac{AM}{AB}$</p> <p>2- قم بقياس أطوال الأضلاع $[AN]$ و $[AC]$، أعط قيمة $\frac{AN}{AC}$</p> <p>3- قم بقياس أطوال الأضلاع $[MN]$ و $[BC]$، أعط قيمة $\frac{MN}{BC}$</p> <p>4- ماذا تلاحظ؟ هل يمكنك توقع النتيجة؟</p> 	<p>أنشطة بنائية</p>
	<p>3- المستقيم الموازي لضلع في مثلث خاصية</p> <p>في مثلث ABC، M نقطة من $[AB]$ و N نقطة من $[AC]$ و $(MN) \parallel (BC)$</p> $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ <p>إذن</p>	<p>ملخص الدروس</p>
المدة: 10 دقائق	<p>مثال</p> <p>في الشكل أسفله $(OL) \parallel (TE)$</p> <p>نعطي $HE=5\text{cm}$, $HL=2\text{cm}$, $TE=7\text{cm}$, $HO=3\text{cm}$</p> <p>لنحسب OL و HT :</p>  <p>في المثلث HTE: $(OL) \parallel (TE)$, $L \in [HE]$, $O \in [HT]$</p> <p>حسب خاصية تناسبية أطوال أضلاع المثلث لدينا :</p> $\frac{OH}{HT} = \frac{HL}{HE} = \frac{OL}{TE}$ <p>يعني $\frac{3}{HT} = \frac{2}{5} = \frac{OL}{7}$</p> <p>يعني $2 \times HT = 3 \times 5$ إذن $HT = \frac{3 \times 5}{2} = 7,5$</p> <p>يعني $5 \times OL = 2 \times 7$ إذن $OL = \frac{2 \times 7}{5} = 2,8$</p>	
المدة: 15 دقائق	<p>تمرين تطبيقي</p> <p>DST مثلث، E نقطة من $[DS]$ و F نقطة من $[DT]$</p> <p>بحيث : $DS = 6,3\text{ cm}$ و $EF = 2,9\text{ cm}$ و $ST = 8,7\text{ cm}$ و $DF = 1,8\text{ cm}$</p> <p>و $(EF) \parallel (ST)$</p> <p>أحسب DE و DT</p>	<p>أنشطة تقويمية</p>

الملاحظات	المحتوى	المراحل
المدة: 10 دقائق	<p>نشاط</p> <p>لاحظ الشكل أسفله بحيث : $FG = 6 \text{ cm}$ و $MN = 4 \text{ cm}$ و $MF = 2 \text{ cm}$ و $(MN) // (FG)$ $EM = x$. أحسب x</p> 	أنشطة تشخيصية
المدة: 20 دقائق	<p>نشاط</p> <p>[AB] قطعة على نصف مستقيم أصله A حامله ليس (AB) لتكن النقطة C حيث : $AC = 5$ و النقطة I من [AC] حيث : $AI = 1$ المستقيم المار من I و الموازي للمستقيم (BC) يقطع [AB] في J</p> <p>1 - بين أن : $\frac{AJ}{AB} = \frac{AI}{AC}$</p> <p>2- أستنتج أن : $AJ = \frac{1}{5} AB$</p> <p>3 - قسم القطعة [AB] إلى خمس قطع متقايسة</p>	أنشطة بنائية
المدة: 10 دقائق	<p>4- تقسيم قطعة إلى قطع متقايسة</p> <p>تعريف</p> <p>لتقسيم قطعة [AB] إلى n قطع متقايسة نتبع الخطوات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ننشئ نصف مستقيم (Δ) مار من A و حامله مختلفا عن (AB) - نعتبر على (Δ) النقطة C بحيث $AC = n$ - على [AC] نأخذ I بحيث $AI = 1$ - نمثل (BC) - ننشئ المستقيم (Δ) المار من I و الموازي ل (BC) الذي يقطع [AB] في I' - نقسم القطعة [AB] بإستعمال البركار و الوحدة AI' . 	ملخص الدروس
	<p>مثال ($n = 5$)</p> 	
المدة: 15 دقائق	<p>تمرين تطبيقي</p> <p>[AB] قطعة بحيث : $AB = 7 \text{ cm}$ قسم القطعة [AB] إلى 5 قطع متقايسة</p>	أنشطة تقويمية