

**الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2015
- الموضوع -**

٢٠١٥ | ملخص
٢٠١٤ | ملخص
٢٠١٣ | ملخص
٢٠١٢ | ملخص



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

RS 24

4

مدة الإنجاز

الرياضيات

المادة

9

المعامل

شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب)

الشعبة أو المسلك

- مدة إنجاز الموضوع هي أربع ساعات.
- يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها .
- يمكن إنجاز التمارين حسب الترتيب الذي يرغب فيه المترشح.

- التمرين الأول يتعلق بالبنيات الجبرية.....(4 ن)
- التمرين الثاني يتعلق بالحسابيات و حساب الاحتمالات.....(3 ن)
- التمرين الثالث يتعلق بالأعداد العقدية.....(3 ن)
- التمرين الرابع يتعلق بالتحليل.....(6 ن)
- التمرين الخامس يتعلق بالتحليل

لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة كيما كان نوعها

لا يسمح باستعمال اللون الأحمر بورقة التحرير

التمرين الأول: (4 نقط)الجزء الأول: نزود ، بقانون التركيب الداخلي * المعرف بما يلي:

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^* y = x + y - e^{xy} + 1$$

1-أ) بين أن القانون * تبادلي في ،

ب) بين أن القانون * يقبل عنصراً محايداً يتم تحديده.

2- علماً أن المعادلة: $0 = 3 + x - e^{2x}$ تقبل في ، حلين مختلفين a و b ،
بين أن القانون * غير تجمعي.الجزء الثاني: نذكر أن $(M_2, +, \cdot)$ حلقة غير تبادلية و واحدية و حدتها $\frac{1}{2}$.و أن $(M_2, +, \cdot)$ فضاء متجهي حقيقي و أن (M_2, \cdot) زمرة تبادلية.
$$F = \left\{ M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right. \text{ ولتكن } M(x, y) = \begin{cases} x & -2y \\ y & x \end{cases}$$

لكل x و y من ، نضع:

1- بين أن F فضاء متجهي جزئي للفضاء المتجهي الحقيقي $(M_2, +, \cdot)$.2- بين أن F جزء مستقر من $(M_2, +, \cdot)$.3- نعتبر التطبيق j من \mathbb{C} نحو F الذي يربط كل عدد عقدي iy بـ $x + iy$ (حيث x و y عدداً حقيقياً)
بالمصفوفة $M(x, y)$.أ) بين أن j تشكل من (\mathbb{C}, \cdot) نحو (F, \cdot) .ب) نضع: $j(\mathbb{C}) = F = F - \{M(0, 0)\}$. بين أن: $F = j(\mathbb{C})$.ج) بين أن (F, \cdot) زمرة تبادلية.4- بين أن $(F, +, \cdot)$ جسم تبادل.التمرين الثاني: (3 نقط)I- 1- ليكن a من \mathbb{C} . بين أنه إذا كان a و 13 أوليان فيما بينهما فإن: $a^{2016} \equiv 1 [13]$ 2- نعتبر في \mathbb{Z} المعادلة: $x^{2015} \equiv 2 [13]$ وليكن x حل للمعادلة (E) .أ) بين أن x و 13 أوليان فيما بينهما.ب) بين أن: $x \equiv 7 [13]$.3- بين أن مجموعة حلول المعادلة (E) هي: $S = \{7 + 13k / k \in \mathbb{Z}\}$ II- نعتبر صندوقاً U يحتوي على خمسين (50) كرة مرقمة من 1 إلى 50. الكرات لا يمكن التمييز بينها باللمس.1- نسحب عشوائياً كرة من الصندوق. ما هو احتمال الحصول على كرة تحمل رقمًا يكون حلًا للمعادلة (E) ؟

2- نسحب عشوائياً كرة من الصندوق، نسجل رقمها ثم نعيدها إلى الصندوق. نكرر هذه التجربة ثلاثة مرات.

ما هو احتمال الحصول مرتين بالضبط على كرة تحمل رقما يكون حل للمعادلة (E) ؟

التمرين الثالث: (3 نقط)

نعتبر في المجموعة \mathcal{L} المعادلة التالية: $(E): z^2 - (1+i)z + 2 + 2i = 0$

أ- تحقق أن $(1-3i)^2$ هو مميز المعادلة (E)

ب) حدد z_1 و z_2 حلّي المعادلة (E) في المجموعة \mathcal{L} (نأخذ z_1 تخيلي صرف)

$$\text{ج) بين أن: } \frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2} e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

2- المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد و منظم و مباشر .

نعتبر النقطة A التي لحقها z_1 و B النقطة التي لحقها z_2

أ) حدد العدد العقدي e لحق النقطة E منتصف القطعة $[AB]$

$$\text{ب) ليكن } r \text{ الدوران الذي مرّ فيه } A \text{ وقياس زاويته } \frac{P}{2}$$

وليكن c لحق النقطة C صورة النقطة E بالدوران r . بين أن:

$$\text{ج) نعتبر } D \text{ النقطة ذات اللحق } i \quad d = 1 + \frac{3}{2}$$

بين أن العدد $\frac{d}{c-d}$ حقيقي ثم أول هندسيا النتيجة المحصل عليها.

التمرين الرابع: (6 نقط)

ليكن n عددا صحيحا طبيعيا غير منعدم.

نعتبر الدالة العددية f_n للمتغير الحقيقي x المعرفة على \mathbb{R} بما يلي:

و ليكن (C_n) المنحني الممثل للدالة f_n في معلم متعامد و منظم .

أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ ثم أول مبيانيا النتيجين المحصل عليهما.

ب) بين أن الدالة f_n قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} ثم أحسب $f'_n(x)$ لكل x من \mathbb{R}

ج) بين أن الدالة f_n تزايدية قطعا على \mathbb{R}

أ- بين أن النقطة $I_n = \frac{1}{2} \ln n$ مركز تماثل للمنحني (C_n)

ب) أنشئ المنحني (C_1)

ج) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدود بين المنحني (C_1) و المستقيمات: $x=0$ و $x=1$ و $y=0$	0.75
3- أ) لكل n من \mathbb{N} ، بين أن المعادلة: $f_n(x)=x$ تقبل حلًا وحيدًا u_n في المجال $[0, n]$	0.75
ب) بين أن: $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ تناقصية قطعًا ثم استنتج أنها متقاربة.	0.5
ج) بين أن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ تناقصية قطعاً ثم استنتج أنها متقاربة.	0.75
د) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	0.5

التمرين الخامس: (4 نقاط)

نعتبر الدالة العددية g المعرفة على \mathbb{R}_+ ، بما يلي:

1- بين أن الدالة g زوجية.

2- بين أن الدالة g قابلة للاشتراق على \mathbb{R}_+ ثم أحسب (g') من أجل $x > 0$

3- أ) باستعمال متكاملة بالأجزاء، تحقق أن:

$$(\forall x > 0) \quad \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = \frac{\sin 3x - 3 \sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$$

ب) بين أنه لكل x من المجال \mathbb{R}_+ : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{2}{x}$ ثم استنتاج (g) لهيكلنا.

4- أ) بين أن: $(\forall t > 0) \quad 1 - \cos t \leq t$ (لاحظ أن: $(\forall x > 0) \quad 0 \leq \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \leq 2x$)

ب) تتحقق أن: $(\forall x > 0) \quad g(x) - \ln 3 = \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt$

ج) استنتاج: $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$

انتهى

$\forall \in (\mathbb{R}^2; x * y = x + y - e^{xy} + 1)$ مزود بالقانون * المعرف كما يلي :

(1) لنبين أن القانون * تبادلي.

$$\forall \in (\mathbb{R}^2; x * y = x + y - e^{xy} + 1) = y + x - e^{yx} + 1 = y * x$$

لدينا $\forall \in (\mathbb{R}^2; x * y = y * x)$

القانون * تبادلي

(ب) لنبين أن القانون * يقبل عنصرا محابيا نحده.

ليكن y من \mathbb{R}

$$(\forall x \in \mathbb{R}; x * y = x) \Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}; x + y - e^{xy} + 1 = x) \Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}; y + 1 = e^{xy}) \Leftrightarrow (y = 0)$$

و بما أن * تبادلي فإن $\forall x \in \mathbb{R}; x * 0 = 0 * x = x$

0 هو العنصر المحابي للقانون *

(2) لنبين أن القانون * غير تجميعي

لدينا α و β حللين مختلفين للمعادلة $3 + \alpha - e^{-2\alpha} = 3 + \beta - e^{-2\beta} = 0$ يعني $3 + x - e^{2x} = 0$

$\alpha * (2 * \beta) = \alpha * 0 = \alpha$ و $(\alpha * 2) * \beta = 0 * \beta = \beta$ يعني $\alpha * 2 = \beta * 2 = 0$

و بما أن $\alpha \neq \beta$ فإن $\alpha * (2 * \beta) \neq (\alpha * 2) * \beta$

القانون * غير تجميعي

نستنتج ان

$$M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x \end{pmatrix} \text{ مع } F = \left\{ M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

(1) لنبين أن F فضاء متتجهي جزئي للفضاء المتتجهي الحقيقي

$(I = M(1, 0) \in F) \text{ و } F \neq \emptyset \text{ لأن } F \subset M_2(\mathbb{R})$

$\forall (M(x, y), M(z, t)) \in F^2 \text{ و } \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

Gassine Mghazli

لدينا

$$\alpha M(x, y) + \beta M(z, t) = \begin{pmatrix} \alpha x & -2\alpha y \\ \frac{\alpha y}{2} & \alpha x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta z & -2\beta t \\ \frac{\beta t}{2} & \beta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x + \beta z & -2(\alpha y + \beta t) \\ \frac{\alpha y + \beta t}{2} & \alpha x + \beta z \end{pmatrix} = M(\alpha x + \beta z, \alpha y + \beta t)$$

إذن $\alpha M(x, y) + \beta M(z, t) \in F$ نستنتج أن :

$(M_2(\mathbb{R}), +, .)$ فضاء متتجي جزئي للفضاء المتتجي الحقيقي F

(2) لنبين أن F جزء مستقر من $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

$$\begin{aligned} (\forall (M(x, y), M(z, t)) \in F^2); M(x, y) \times M(z, t) &= \begin{pmatrix} x & -2y \\ \frac{y}{2} & x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} z & -2t \\ \frac{t}{2} & z \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xz - yt & -2(xt + yz) \\ \frac{yz + xt}{2} & -yt + xz \end{pmatrix} = M(xz - yt, xt + yz) \in F \end{aligned}$$

إذن F جزء مستقر من $(M_2(\mathbb{R}), \times)$

(3) φ تطبيق من \mathbb{C}^* نحو F بحيث :

(أ) لنبين أن φ تشكل من (\mathbb{C}^*, \times) نحو (F, \times)

$$\begin{aligned} (\forall ((x, y), (z, t)) \in (\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\})^2); \varphi((x+iy) \times (z+it)) &= \varphi(xz - yt + i(xt + yz)) \\ &= M(xz - yt, xt + yz) \\ (\text{حسب السؤال (2)}) &= M(x, y) \times M(z, t) \\ &= \varphi(x+iy) \times \varphi(z+it) \end{aligned}$$

φ تشكل من (\mathbb{C}^*, \times) نحو (F, \times)

إذن

(ب) نضع $\varphi(\mathbb{C}^*) = F^*$ لنبين أن $F^* = F - \{M(0, 0)\}$

$\varphi(x+iy) = M(0, 0) \Leftrightarrow M(x, y) = M(0, 0) \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0)$

يعني $(x, y) \neq (0, 0) \Leftrightarrow \varphi(x+iy) \neq M(0, 0)$

يعني $z \in \mathbb{C}^* \Leftrightarrow \varphi(z) \in F^*$

$\varphi(\mathbb{C}^*) = F^*$

و منه

(ج) لنبين أن (F^*, \times) زمرة تبادلية

لدينا $\varphi(\mathbb{C}^*) = F^*$ زمرة تبادلية و φ تشكل من (\mathbb{C}^*, \times) نحو (F, \times) .

(F^*, \times) زمرة تبادلية

إذن

Gassine Mghazli

- لنبين أن $(F, +, \times)$ جسم تبادلي (4)
- بما أن F فضاء متجهي جزئي للفضاء المتجهي الحقيقي $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ فإن $(F, +, \cdot)$ زمرة تبادلية.
- بما أن \times توزيعي على $+$ في $M_2(\mathbb{R})$ و F جزء مستقر بالنسبة ل \times ول $+$ فإن \times توزيعي على $+$ في F .
- نستنتج أن $(F, +, \times)$ جسم تبادلي

التمرين الثاني

$$a \wedge 13 = 1 \Rightarrow a^{2016} \equiv 1[13] \quad a \in \mathbb{Z} - 1 - I$$

العدد 13 أولي إذن حسب مبرهنة فرما الصغرى لدينا $a^{12} \equiv 1[13]$ و بما ان $a^{13} \equiv a[13]$

$$a^{2016} \equiv 1[13] \quad \text{و أخيرا نحصل على المطلوب}$$

. (E) : $x^{2015} \equiv 2[13]$ ولتكن x حل للمعادلة

(1) لنبين أن x و 13 أوليان في ما بينهما

بالخلاف نفترض أن 13 يقسم x

$$\begin{cases} 13|x \\ x^{2015} \equiv 2[13] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 13|x^{2015} \\ x^{2015} \equiv 2[13] \end{cases} \Rightarrow 13|2$$

و هذا غير ممكن إذن الإفراض خاطئ ومنه 13 لا يقسم x

$$x \text{ و } 13 \text{ أوليان في ما بينهما}$$

نستنتج أن

$$x \equiv 7[13] \quad (2) \quad \text{لنبين أن } x \equiv 7[13]$$

بما أن x و 13 أوليان في ما بينهما فإن حسب السؤال 1- لدينا $x^{2016} \equiv 1[13]$

$$x^{2016} \equiv 2x[13] \quad \text{فإن } x^{2015} \equiv 2[13]$$

نستنتج أن $2x \equiv 1[13]$ ما يستلزم أن $x \equiv 7[13]$ و حيث أن $14x \equiv 7[13]$ فإن $14x \equiv 14x \equiv 7[13]$ وهذا هو المطلوب

$$x \equiv 7[13]$$

(3) لنبين أن مجموعة حلول المعادلة (E) هي $S = \{7 + 13k / k \in \mathbb{Z}\}$

$$x^{2015} \equiv 2[13] \Rightarrow x \equiv 7[13] \quad (4) \quad \text{لدينا}$$

لنبين أن $x \equiv 7[13] \Rightarrow x^{2015} \equiv 2[13]$

$$x \equiv 7[13] \Rightarrow x^{2015} \equiv 7^{2015}[13] \quad (\ast) \quad \text{لدينا}$$

Gassine Mghazli

لنحدد باقي قسمة 7^n على 13

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	n
1	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	باقي قسمة 7^n على 13

$$\begin{cases} 7^{12} \equiv 1[13] \\ 7^{11} \equiv 2[13] \end{cases} \Rightarrow 7^{12 \times 167 + 11} \equiv 2[13] \Rightarrow 7^{2015} \equiv 2[13]$$

(*) تصبح $x \equiv 7[13] \Rightarrow x^{2015} \equiv 2[13]$

لقد بينا أن المعادلة (E) تكافئ

$$x \equiv 7[13] \Leftrightarrow (x - 7 = 13k; k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow x \in S$$

و بالتالي :

S هي مجموعة حلول المعادلة E

(1) ليكن n هو رقم الكرة المسحوبة

$$\begin{cases} n \in S \\ n \in \{1, 2, \dots, 50\} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (\exists k \in \mathbb{Z}; n = 7 + 13k) \\ n \in \{1, 2, \dots, 50\} \end{cases} \Leftrightarrow n \in \{7, 20, 33, 46\}$$

. ومنه الاحتمال المطلوب هو $\frac{4}{50}$

احتمال الحصول على كرة رقمها حل للمعادلة (E) هو $\frac{2}{25}$

$$(2) \text{ ليكن } X \text{ المتغير العشوائي الحداني الذي وسيطاه } n = 3 \text{ و } p = \frac{2}{25}$$

الاحتمال المطلوب هو $p(X = 2)$

$$p(X = 2) = C_3^2 p^2 (1-p) = 3 \times \frac{4}{625} \times \frac{23}{25} = \frac{276}{15625}$$

احتمال الحصول مرتين بالضبط على كرة رقمها حل للمعادلة (E) هو $\frac{276}{15625}$

التمرين الثالث

نعتبر في \mathbb{C} المعادلة $(E): z^2 - (1+i)z + 2 + 2i = 0$

(1) أ) لنحسب Δ مميز المعادلة (E)

$$\Delta = (1+i)^2 - 4(2+2i) = 2i - 8 - 8i = 1 - 6i - 9 = (1-3i)^2$$

مميز المعادلة (E) هو $(1-3i)^2$

ب) تحديد حل المعادلة (E)

$$z_2 = \frac{1+i+1-3i}{2} = 1-i \quad \text{و} \quad z_1 = \frac{1+i-1+3i}{2} = 2i$$

Gassine Mghazli

$$z_1 = 2i \quad \text{و} \quad z_2 = 1 - i$$

ج) لتبين أن $\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2i}{1-i} \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \sqrt{2}e^{i\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

لدينا

$$\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

و منه

أ. لنحدد e لحق E منتصف القطعة $[AB]$

$$e = \frac{1+i}{2}$$

لدينا $e = \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{1+i}{2}$ و منه

ب. r الدوران الذي مر عليه A و قياس زاويته $\frac{-\pi}{2}$

$$r(E) = C \Leftrightarrow c - z_1 = e^{-i\frac{\pi}{2}}(e - z_1) \Leftrightarrow c = -i\left(\frac{1+i}{2} - 2i\right) + 2i \Leftrightarrow c = \frac{-1}{2}i + \frac{1}{2} - 2 + 2i \Leftrightarrow c = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$c = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$$

ج) النقطة ذات اللحق D النقطة ذات اللحق i لتبين أن العدد $d = 1 + \frac{3}{2}i$ حقيقي.

$$\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) = \frac{1 - i - 1 - \frac{3}{2}i}{-\frac{5}{2}} = i \quad \text{و} \quad \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \frac{\frac{-3}{2} + \frac{3}{2}i - 2i}{1 - 3i} = \frac{1}{2} \frac{-3 - i}{i(-i + 3)} = \frac{-1}{2}i$$

لدينا

$$\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \times \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) = i \times \frac{-i}{2} = \frac{1}{2}$$

إذن

$$\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \times \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right) = \frac{1}{2}$$

التأويل الهندسي:

$$\arg\left(\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) \times \left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right)\right) \equiv \arg\left(\frac{z_2 - d}{c - d}\right) + \arg\left(\frac{c - z_1}{z_2 - z_1}\right)[2\pi]$$

لدينا

Gassine Mghazli

$$\arg\left(\frac{z_2-d}{c-d}\right) + \arg\left(\frac{c-z_1}{z_2-z_1}\right) \equiv \overline{(DC,DB)} + \overline{(AB,AC)}[2\pi] \text{ و}$$

$$\overline{(DC,DB)} + \overline{(AB,AC)} \equiv [2\pi] \text{ فإن } \arg\left(\frac{1}{2}\right) \equiv 0[2\pi]$$

$$\text{نستنتج أن } \overline{(DC,DB)} \equiv \overline{(AC,AB)}[2\pi]$$

$$\overline{(DC,DB)} \equiv \overline{(AC,AB)} \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi] \text{ إذن } \left(\frac{c-z_1}{z_2-z_1}\right) = -\frac{i}{2} \text{ و } \left(\frac{z_2-d}{c-d}\right) = i \text{ و حسب ما سبق}$$

نستنتج أن

النقط A B C D متداورة و تنتمي إلى الدائرة ذات القطر $[BC]$

التمرين الرابع

$$n \in \mathbb{N}^*; \forall x \in \mathbb{R}; f_n(x) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}$$

$$y=1 \text{ و منه لـ } (C_n) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} = 0 \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} = 1 \quad (1)$$

$$y=0 \text{ و منه لـ } (C_n) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{3}{2}(x-n)} = +\infty \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} = 0 \text{ معادلته}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = 0$

$y=0$ مقارب عند $+\infty$ معادلته $y=1$ و (C_n) مقارب عند $-\infty$ معادلته

ب) لنبين أن f_n قابلة للإشتقاق على \mathbb{R}

الدالة $x \rightarrow 1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}$ قابلة للإشتقاق على \mathbb{R} إذن الدالة $x \rightarrow e^{-\frac{3}{2}(x-n)}$ قابلة للإشتقاق على \mathbb{R} و بما أن $\forall x \in \mathbb{R}; 1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \neq 0$ فإن

الدالة f_n قابلة للإشتقاق على \mathbb{R}

Gassine Mghazli

حساب $f_n'(x)$

$$(\forall x \in \mathbb{R}); f_n'(x) = \frac{3}{2} \frac{e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}{\left(1+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2}$$

\mathbb{R} إذن f_n تزايدية قطعا على

(ج)

(٢) لنبين أن النقطة $I_n\left(n, \frac{1}{2}\right)$ مركز تماثل للمنحنى (C_n)

لدينا $\forall x \in \mathbb{R}; 2n - x \in \mathbb{R}$

$$f_n(2n-x) = \frac{1}{1+e^{-\frac{3}{2}(2n-x-n)}} = \frac{1}{1+e^{-\frac{3}{2}(n-x)}} = \frac{e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}{e^{-\frac{3}{2}(x-n)} + 1} = 1 - \frac{1}{1+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} = 1 - f_n(x)$$

نستنتج أن $I_n\left(n, \frac{1}{2}\right)$ مركز تماثل للمنحنى (C_n)


(ب) إنشاء (C_1)

جدول تغيرات الدالة f_1

x	$-\infty$	$+\infty$
$f_1(x)$	0	↗ 1

Gassine Mghazli

مبيان f_1



ج) حساب مساحة الحيز المستوي المحدود بين المنحني (C_1) و المستقيمات التي معادلاتها على التوالي $x=0$ و $x=1$ و $y=0$

$$\int_0^1 f_1(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+e^{-\frac{3}{2}(x-1)}} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{3}{2}(x-1)}}{1+e^{\frac{3}{2}(x-1)}} dx = \left[\ln \left(1+e^{\frac{3}{2}(x-1)} \right) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln \left(1+e^{-\frac{3}{2}} \right) = \ln \left(\frac{2}{1+e^{-\frac{3}{2}}} \right)$$

لدينا

$\|i\| \times \|j\| \times \ln \left(\frac{2}{1+e^{-\frac{3}{2}}} \right)$

المساحة المطلوبة هي

و منه

(2) لنبين أن المعادلة $f_n(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً u_n في المجال $[0, n]$

$$\varphi_n(x) = f_n(x) - x$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}); \varphi_n(x) = \frac{3}{2} \frac{e^{-\frac{3}{2}(x-n)}}{\left(1+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2} - 1 = -\frac{2+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}+2e^{-3(x-n)}}{2\left(1+e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)^2} < 0$$

و φ_n قابلة للإشتقاق على \mathbb{R}

$\varphi_n(\mathbb{R})$ متصلة و تناقصية فقطعاً على \mathbb{R} إذن φ_n تقابل من \mathbb{R} نحو

$$\varphi_n(\mathbb{R}) = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_n(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi_n(x) \right] = [-\infty, +\infty]$$

نسنستنتج أن المعادلة $\varphi_n(n) = f_n(n) - n = \frac{1}{2} - n < 0$ و $\varphi_n(0) = f_n(0) > 0$ و بما أن $\varphi_n(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً u_n و بما أن

Gassine Mghazli

فإن (حسب مبرهنة القيم الوسطية)

$$\boxed{(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; \exists! u_n \in]0, n[/ f_n(u_n) = u_n}$$

$$\begin{aligned} (\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R}) f_{n+1}(x) - f_n(x) &= \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}} - \frac{1}{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}} \\ &= \frac{1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)} - 1 - e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}}{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}\right)} = \frac{e^{-\frac{3}{2}(x-n)} \left(1 - e^{\frac{3}{2}}\right)}{\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n)}\right)\left(1 + e^{-\frac{3}{2}(x-n-1)}\right)} < 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R}) f_{n+1}(x) < f_n(x)}$$

ج) لنبين أن المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ تناقصية قطعا ثم لستنتاج أنها متقاربة

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\forall x \in \mathbb{R}) : f_{n+1}(x) < f_n(x) \Rightarrow f_{n+1}(x) - x < f_n(x) - x \quad \text{لدينا}$$

$$\Rightarrow \varphi_{n+1}(x) < \varphi_n(x)$$

$$\Rightarrow \varphi_{n+1}(u_{n+1}) < \varphi_n(u_{n+1})$$

$$\Rightarrow \varphi_n(u_n) < \varphi_n(u_{n+1}) \quad (\varphi_{n+1}(u_{n+1}) = \varphi_n(u_n) = 0 \text{ لأن})$$

و بما أن الدالة φ_n تناقصية قطعا على \mathbb{R} فإن $u_n > u_{n+1}$

نستنتج أن : المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ تناقصية قطعا

$$\boxed{\text{المتالية } (u_n)_{n \geq 1} \text{ تناقصية قطعا}}$$

إستنتاج : بما أن المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ تناقصية قطعا و مصغورة ب 0 فإنها متقاربة

$$\boxed{\text{المتالية } (u_n)_{n \geq 1} \text{ متقاربة}}$$

د) لحسب نهاية المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$

المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ متقاربة والدالة f_n متصلة على المجال $[0, n]$ و تحقق أن

إذن المتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ تقبل نهاية l تتحقق $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(l) = l$ و لدينا $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(l) = l$ نستنتج أن

Gassine Mghazli

$$\lim u_n = 0$$

التمرين الخامس

نعتبر الدالة g المعرفة على \mathbb{R}^* ب

(1) لتبين أن الدالة g زوجية

$$\forall x \in \mathbb{R}^*; -x \in \mathbb{R}^* \quad g(-x) = \int_{-x}^{-3x} \frac{\cos t}{t} dt = \int_x^{3x} \frac{\cos(-u)}{-u} (-du) = \int_x^{3x} \frac{\cos u}{u} du = g(x)$$

الدالة g زوجية

نستنتج أن

(2) الدالة $t \rightarrow \frac{\cos t}{t}$ متصلة على $[0, +\infty]$ إذن تقبل دالة أصلية φ على هذا المجال

$$g(x) = \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = [\varphi(t)]_x^{3x} = \varphi(3x) - \varphi(x)$$

بما أن الدالة φ قابلة للإشتقاق (أصلية) على $[0, +\infty]$ ولدينا :

$$(\forall x > 0); g'(x) = 3\varphi'(3x) - \varphi'(x) = 3 \frac{\cos 3x}{3x} - \frac{\cos x}{x} = \frac{\cos 3x - \cos x}{x}$$

$$(\forall x > 0); g'(x) = \frac{\cos 3x - \cos x}{x}$$

$$\forall x > 0; \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = \frac{\sin 3x - 3\sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \quad (3)$$

$$\forall x > 0; \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = \left[\frac{\sin t}{t} \right]_x^{3x} - \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt = \frac{\sin 3x}{3x} - \frac{\sin x}{x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt = \frac{\sin 3x - 3\sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$$

لدينا إذن

$$\forall x > 0; \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt = \frac{\sin 3x - 3\sin x}{3x} + \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt$$

(ب) لتبين أن $(\forall x > 0); |g(x)| < \frac{2}{x}$

$$(\forall x > 0); |g(x)| < \left| \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \right| \leq \left| \frac{\sin 3x - 3\sin x}{3x} \right| + \left| \int_x^{3x} \frac{\sin t}{t^2} dt \right| \leq \frac{4}{3x} + \int_x^{3x} \frac{1}{t^2} dt$$

Gassine Mghazli

$$(\forall x > 0); x \leq t \leq 3x \Rightarrow \frac{1}{3x} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{t^2} \leq \frac{1}{x^2} \Rightarrow \int_x^{3x} \frac{1}{t^2} dt \leq \int_x^{3x} \frac{1}{x^2} dt$$

$$\int_x^{3x} \frac{1}{x^2} dt = \left[-\frac{1}{x} \right]_x^{3x} = \frac{-1}{3x} + \frac{1}{x} = \frac{2}{3x}$$

نستنتج أن $(\forall x > 0); |g(x)| < \frac{4}{3x} + \frac{2}{3x}$ وبالتالي :

$$(\forall x > 0); |g(x)| < \frac{2}{x}$$

$$(\forall x > 0); 0 \leq \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \leq 2x \quad (4)$$

$$(\forall t > 0); 1 - \cos t \leq t \Rightarrow \frac{1 - \cos t}{t} \leq 1 \Rightarrow \int_x^{3x} \frac{1 - \cos t}{t} dt \leq \int_x^{3x} dt$$

لدينا $\int_x^{3x} dt = 2x$ و نستنتج أن :

$$(\forall x > 0); 0 \leq \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \leq 2x$$

$$(b) \text{ لنتحقق أن } (\forall x > 0); g(x) - \ln 3 = \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt$$

$$(\forall x > 0); \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt = g(x) - \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt = g(x) - [\ln t]_x^{3x} = g(x) - (\ln 3x - \ln x) = g(x) - \ln 3$$

لدينا و منه

$$(\forall x > 0); \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt = g(x) - \ln 3$$

$$(c) \text{ لنتتحقق أن } (\forall x > 0); g(x) - \ln 3 = \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \text{ و بما أن } \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt = 0 \text{ إذن } (\forall x > 0); 0 \leq \int_x^{3x} \frac{\cos t - 1}{t} dt \leq 2x$$

فإن $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) - \ln 3 = 0$ وبالتالي

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \ln 3$$

إنتهى