



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2011

الموضوع

3	المعامل	NS36	علوم الحياة والأرض	المادة
2	مذكرة الإنجاز		شعبة العلوم الرياضية (أ)	الشعب(ات) او الميدالية

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة

التمرين الأول (4 نقاط)

هناك مجموعة من الأمراض الوراثية تصيب الذكور دون الإناث أو العكس، من بين هذه الأمراض ما هو مرتبط بمورثات معينة، ومنها ما هو مرتبط بشذوذ صبغي. بواسطة عرض سليم ومنظماً:

- عرف الشذوذ الصبغي والوراثة المرتبطة بالجنس. (1 ن)

- بين كيفية انتقال الأمراض الوراثية المرتبطة بالصبغي الجنسي X في حالة التحدي. (1.5 ن)

- بالاعتماد على حالة مرض Turner كمثال، وضح كيفية الإصابة بهذا المرض المرتبط بشذوذ صبغي

معززاً بذلك برسم تخطيطي ملائم. (1.5 ن)

التمرين الثاني (6 نقاط)

تعتبر ذبابة الخل أداة تجريبية أساسية لدراسة انتقال الصفات الوراثية. للكشف عن كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية نجز عدة تزاوجات عند هذه الذبابة، نتتبع فيها انتقال صفتين وراثيتين؛ شكل الرغب وشكل الأجنحة:

- المورثة cu المسئولة عن شكل الأجنحة لها حليل cu⁺ سائد مسؤول عن المظهر الخارجي "أجنحة عادية"، والحليل cu متاح مسؤول عن المظهر الخارجي "أجنحة معقوفة".

- المورثة sb المسئولة عن شكل الرغب لها حليل sb⁺ سائد مسؤول عن المظهر الخارجي "رغب قصير"، والحليل sb متاح مسؤول عن المظهر الخارجي "رغب عادي".

التزاوج الأول: بين أنثى بأجنحة عادية وذكر بأجنحة عادية. أعطى هذا التزاوج جيلاً مكوناً من:

- 310 فرداً بأجنحة عادية؛

- 101 فرداً بأجنحة معقوفة.

التزاوج الثاني: بين أنثى بزغب قصير وذكر بزغب قصير. أعطى هذا التزاوج جيلاً مكوناً من:

- 242 فرداً بزغب قصير؛

- 120 فرداً بزغب عادي.

1. فسر نتائج التزاوجين الأول والثاني مستعيناً بشبكة التزاوج. (2 ن)

التزاوج الثالث: بين ذكر بزغب عادي وأجنحة معقوفة، وأنثى بزغب قصير وأجنحة عادية. أعطى هذا التزاوج النتائج الآتية:

- 45,9 % فرداً بزغب قصير وأجنحة عادية؛

- 45,9 % فرداً بزغب عادي وأجنحة معقوفة؛

- 4,1 % فرداً بزغب عادي وأجنحة عادية؛

- 4,1 % فرداً بزغب قصير وأجنحة معقوفة.

2. فسر نتائج التزاوج الثالث مستعيناً بشبكة التزاوج. (1.5 ن)

3. بالاعتماد على إجاباتك السابقة:
- أ. حدد النمط الوراثي لذبابة خل بمظهر خارجي زغب قصير وأجنحة معقوفة معللاً إجابتك. (0.75 ن)
 - ب. حدد النتيجة المتوقعة من تزاوج أنثى بزغب قصير وأجنحة معقوفة بذكر بزغب قصير وأجنحة معقوفة معللاً إجابتك بشبكة التزاوج. (0.75 ن)
4. علماً أن المسافة بين المورثة sb المسؤولة عن شكل الزغب ومورثة st مسؤولة عن لون العيون عند ذبابة الخل هو cMg_6 ، أنجز الخريطتين العاملية الممكنتين للمورثات الثلاث sb و cu و st . (1 ن)
(استعمل $0,5 \text{ cm} / 1 \text{ cMg}$ لكل).

التمرين الثالث (5 نقط)

قصد تحسين الإنتاج على مستوى تربية الماشي قام تقني زراعي بتتبع زيادة وزن 100 فرد عند جماعتين مختلفتين من الماشية P_1 و P_2 ، وذلك خلال نفس المدة. يمثل الجدول الآتي النتائج الإحصائية المحصلة:

(ملحوظة: 1 رطل = 453,59 g).

												وسط الفئة (بالرطل)
55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5		ترددات
3	6	9	11	13	16	13	11	9	6	3	P_1	
0	0	0	2	21	54	21	2	0	0	0	P_2	

1. مثل على نفس المبيان منحنى تردد زيادة الوزن عند الجماعتين P_1 و P_2 (استعمل 1cm لكل فئة، و 1cm لعدد يساوي 5 أفراد). (1.5 ن)

أعطت الدراسة الإحصائية عند الجماعة P_1 الثابتات الإحصائية المبينة في الجدول الآتي:

الانحراف المعياري δ	الوسط الحسابي \bar{X} بالرطل	المنوال بالرطل	الثابتات الإحصائية
$\delta = 12.42$	$\bar{X} = 30$	$Mo = 30$	القيم

2. حدد قيمة المنوال واحسب قيمة كل من الوسط الحسابي والانحراف المعياري عند الجماعة P_2 وذلك بإنجاز جدول تطبيقي لحساب هذه الثابتات. نعطي $\sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \delta = 0.5$ (1.5 ن)

3. قارن بين توزيع الجماعتين على مستوى التمثيل البياني، وعلى مستوى الثابتات الإحصائية، مبرزاً أي الجماعتين أكثر تجانساً. (1.5 ن)

4. هل سيؤثر اختلاف التوزيع بين الجماعتين على المردودية الإنتاجية عند الفلاح. على إجابتك. (0.5 ن)

التمرين الرابع (5 نقاط)

تحكم في لون الأجنحة عند نوع من الفراشات، مورثة بحليلين A و a، وقد بينت دراسة أولية أن المظهر الفاتح متاح ويقابله النمط الوراثي a//a. نعتبر تردد الحليل A هو p وتردد الحليل a هو q.

ممكن القبض، في وسط طبيعي، على 1600 فراشة من ساكنة P، منها 1344 فراشاً بمظهر قاتم، و256 فراشاً بمظهر فاتح.

1. باعتبار هذه الساكنة خاضعة لقانون Hardy-Weinberg، احسب ترددات الأنماط الوراثية وتردد الحليلين A و a. (1.25 ن)

		نتيجة المجموعة 1	نتيجة المجموعة 2	نتيجة المجموعة 3
		المجموعة		
			A	الحليل a
		—	—	—
15	47	38		
عدد أفراد كل مجموعة				

ترمز المورثة المدروسة لأحد الأنزيمات المتقدمة في تركيب الصبغات الملونة للأجنحة، ويمكن رصد هذه المورثة عن طريق تقنية التحديد الدقيق للحليلات المعتمدة على الهجرة الكهربائية؛ وتمثل الوثيقة جانبه النتائج المحصلة عند عينة ممثلة للساكنة P، تكون من 100 فرد:

2. انطلاقاً من معطيات هذه الوثيقة، حدد الأنماط الوراثية المناسبة لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة معللاً إجابتك، واحسب ترددى الحليلين A و a عند هذه العينة. (1.75 ن)

3. تمثل الأعداد 38 و 47 والأعداد الملاحظة لأفراد كل مجموعة:

أ- احسب الأعداد المنتظرة (النظرية) لمختلف الأنماط الوراثية في حالة توازن الساكنة.(1,5 ن)

ب- قارن بين الأعداد النظرية والملاحظة لترددات مختلف الأنماط الوراثية للعينة ثم بين أن الساكنة المدروسة في حالة توازن حسب قانون Hardy-Weinberg (0,5 ن)

(ملحوظة: عندما تكون الأعداد الملاحظة والأعداد المنتظرة أو النظرية متقاربة، تعتبر أن الساكنة في حالة توازن.)



الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2011

عناصر الإجابة

3	المعامل	NR36	علوم الحياة والأرض	المادة
2	مذكرة الإنجاز		شعبة العلوم الرياضية (أ)	الشعب(ة) او الميدالية

التمرين الأول (4 نقط)

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
0.5 ن	- الشذوذ الصبغي: تغير يصيب بنية الصبغيات (ضياع أو انتقال صبغيات أو قطع منها) أو عدد الصبغيات (زيادة أو نقصان أحد الصبغيات).....	التعريف
0.5 ن	- الوراثة المرتبطة بالجنس هي مجموع الصفات الوراثية المنقولة بواسطة الصبغيات الجنسية.....	
1 ن	انتقال الأمراض الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي X في حالة التتحي تكون الأم مختلقة الاقتران ناقلة للمرض، ويظهر المرض عند الذكور دون الإناث (أو يكون أكثر انتشارا عند الذكور)، لكنهم يتلقون الصبغي X الحامل للحليل المسؤول عن المرض من الأم، ويكون احتمال ظهور المرض لديهم هو ½.....	
0.5 ن	يساهم الذكور في نقل المرض إلى الخلف في حالة أب مصاب وأم مصابة متشابهة الاقتران أو أم سليمة مختلفة الاقتران.....	
0.75 ن	ظهور مرض وراثي مرتبط بشذوذ في الصبغيات الجنسية: حالة مرض Turner في هذه الحالة يكون الأبوان سليمين، وإثر الانفصال غير السليم لزوج الصبغيات الجنسية أثناء الانقسام الاخترالي عند تشكيل الأمشاج لدى أحد الأبوين نحصل على مشيج بدون صبغي جنسي، وعند الإخصاب مع مشيج عادي يحمل الصبغي الجنسي X تحدث حالة أحادي الصبغي X المؤدية لمرض Turner.	
0,75 ن	رسم تفسيري صحيح مصحوب بالتعليق.....	

التمرين الثاني (6 نقط)

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال												
1 ن	<p>- تفسير نتائج التزاوج الأول:</p> <p>أعطي تزاوج ذيابتين بمظاهر خارجي سائد $[cu^+]$ جيلا غير متجانس مما يدل على أن الأبوين مختلفا الاقتران: $.cu^+/cu$.</p> <p>نسب المظاهر الخارجية المحصل عليها هي $[cu^+] \text{ بنسبة } 3/4 \text{ و } [cu] \text{ بنسبة } 1/4$.</p> <p>شبكة التزاوج:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">♀</td> <td style="text-align: center;">♂</td> <td style="text-align: center;">$cu^+/ (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$cu/ (1/4)$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$cu^+/ (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$cu^+/cu + [cu^+] (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$cu^+/cu [cu^+] (1/4)$</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$cu/ (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$cu^+/cu [cu^+] (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$cu//cu [cu] (1/4)$</td> <td></td> </tr> </table> <p>- تفسير نتائج التزاوج الثاني:</p> <p>أعطي تزاوج ذيابتين بمظاهر الخارجي سائد $[sb^+]$ جيلا غير متجانس مما يدل على أن الأبوين مختلفا الاقتران: $.sb^+/sb$.</p> <p>المظاهر المحصل عليها هي $[sb^+] \text{ بنسبة } 2/3 \text{ و } [sb] \text{ بنسبة } 1/3$ إذن الحليل sb^+ مميت في حالة تشابه الاقتران.</p>	♀	♂	$cu^+/ (1/4)$	$cu/ (1/4)$	$cu^+/ (1/4)$	$cu^+/cu + [cu^+] (1/4)$	$cu^+/cu [cu^+] (1/4)$		$cu/ (1/4)$	$cu^+/cu [cu^+] (1/4)$	$cu//cu [cu] (1/4)$		1
♀	♂	$cu^+/ (1/4)$	$cu/ (1/4)$											
$cu^+/ (1/4)$	$cu^+/cu + [cu^+] (1/4)$	$cu^+/cu [cu^+] (1/4)$												
$cu/ (1/4)$	$cu^+/cu [cu^+] (1/4)$	$cu//cu [cu] (1/4)$												

النقطة	عنصر الإجابة	السؤال															
ن 1	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">♂</td> <td style="text-align: center;">$sb^+ / (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$sb / (1/4)$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">♀</td> <td style="text-align: center;">$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$</td> <td style="text-align: center;">$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$sb^+ / (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$</td> <td style="text-align: center;">$sb / sb [sb] (1/3)$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$sb / (1/4)$</td> <td style="text-align: center;">$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$</td> <td style="text-align: center;">$sb / sb [sb] (1/3)$</td> </tr> </table>	♂	$sb^+ / (1/4)$	$sb / (1/4)$	♀	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$	$sb^+ / (1/4)$	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$	$sb / sb [sb] (1/3)$	$sb / (1/4)$	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$	$sb / sb [sb] (1/3)$	شبكة التزاوج:			
♂	$sb^+ / (1/4)$	$sb / (1/4)$															
♀	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$															
$sb^+ / (1/4)$	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$	$sb / sb [sb] (1/3)$															
$sb / (1/4)$	$sb^+ / sb [sb^+] (1/3)$	$sb / sb [sb] (1/3)$															
ن 0.5	<p>تفسير نتائج التزاوج الثالث: أعطى هذا التزاوج مظهرين أبوين $[sb^+, cu]$ و $[sb, cu]$ بنسبة 91.8% ومظهرين جديدي التركيب $[sb^+, cu]$ و $[sb, cu^+]$ بنسبة 8.2% إذن فهو تزاوج اختباري ويتعلق الأمر بمورثتين مرتبطتين.</p> <p>المظهر الخارجي للأبوين :</p> $\begin{array}{c} [sb^+, cu^+] \times [sb, cu] \\ \hline \begin{array}{c} sb^+ \quad cu^+ \\ \hline sb \quad cu \end{array} \end{array}$ <p>النمط الوراثي للأباء:</p> <p>الأمشاج: شبكة التزاوج:</p> <table border="1"> <tr> <td>$sb^+ cu^+$ 45.9%</td> <td>$sb^+ cu$ 4.1%</td> <td>$sb cu^+$ 4.1%</td> <td>$sb cu$ 45.9%</td> <td>♂</td> </tr> <tr> <td>$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$</td> <td>$sb^+ cu [sb^+, cu]$</td> <td>$sb cu^+ [sb, cu^+]$</td> <td>$sb cu [sb, cu]$</td> <td>♀</td> </tr> <tr> <td>$sb cu$ 45.9%</td> <td>$sb cu$ 4.1%</td> <td>$sb cu$ 4.1%</td> <td>$sb cu$ 45.9%</td> <td></td> </tr> </table>	$sb^+ cu^+$ 45.9%	$sb^+ cu$ 4.1%	$sb cu^+$ 4.1%	$sb cu$ 45.9%	♂	$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$	$sb^+ cu [sb^+, cu]$	$sb cu^+ [sb, cu^+]$	$sb cu [sb, cu]$	♀	$sb cu$ 45.9%	$sb cu$ 4.1%	$sb cu$ 4.1%	$sb cu$ 45.9%		2
$sb^+ cu^+$ 45.9%	$sb^+ cu$ 4.1%	$sb cu^+$ 4.1%	$sb cu$ 45.9%	♂													
$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$	$sb^+ cu [sb^+, cu]$	$sb cu^+ [sb, cu^+]$	$sb cu [sb, cu]$	♀													
$sb cu$ 45.9%	$sb cu$ 4.1%	$sb cu$ 4.1%	$sb cu$ 45.9%														
ن 0.75	<p>نط - sb^+ حليل ميت في حالة تشبه الإقتران، إذن كل فرد بمظهر $[sb^+]$ له نط sb^+ - حليل ممتلئ، إذن النمط الوراثي لكل فرد $[cu]$ هو $\frac{1}{3} cu$ و $\frac{2}{3} cu^+$ هو المورثتان مرتبطتان، وبالتالي فالنمط الوراثي لكل فرد $[sb^+, cu]$ هو $\frac{1}{3} [sb^+, cu]$ و $\frac{2}{3} [sb, cu]$.</p> <p>النتيجة المتوفعة هي: $[sb, cu]$ 1/3 و $[sb^+, cu]$ 2/3 .</p> <p>التعديل بشبكة التزاوج:</p> <table border="1"> <tr> <td>$sb cu$</td> <td>$sb^+ cu$</td> <td>♂</td> </tr> <tr> <td>$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$</td> <td>$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$</td> <td>♀</td> </tr> <tr> <td>$sb cu$</td> <td>$sb cu$</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td>$sb cu^+ [sb, cu]$</td> <td>$sb cu^+ [sb, cu]$</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> </table>	$sb cu$	$sb^+ cu$	♂	$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$	$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$	♀	$sb cu$	$sb cu$	$\frac{1}{2}$	$sb cu^+ [sb, cu]$	$sb cu^+ [sb, cu]$	$\frac{1}{2}$	3 أ ب			
$sb cu$	$sb^+ cu$	♂															
$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$	$sb^+ cu^+ [sb^+, cu]$	♀															
$sb cu$	$sb cu$	$\frac{1}{2}$															
$sb cu^+ [sb, cu]$	$sb cu^+ [sb, cu]$	$\frac{1}{2}$															
ن 0.75	<p>إنجاز الخريطة العاملية:</p>	4															
ن 1	التمرين الثالث (5 نقاط)																
النقطة	إنجاز المبيان على نفس المعلم:	السؤال															
ن 1.5		1															

اعتماد جدول تطبيقي لحساب الثوابت الإحصائية لـ P_2 :

$(xi - \bar{X})^2$	$xi * f(P_2)$	$f(P_2)$	xi
200	40	2	20
525	525	21	25
0	1620	54	30
525	735	21	35
200	80	2	40
1450	3000	المجموع	

حساب صحيح للثوابت الإحصائية

- المنوال: 30 رطل - الوسط الحسابي بالرطل:

- الانحراف المعياري $\delta = 3,80$ (لا تسلم النقطة في حالة إعطاء قيم الثوابت دون اعتماد الجدول التطبيقي)

- مقارنة على مستوى التمثيل البياني: المجموعة P_1 أكثر تشتتاً من المجموعة P_2

- مقارنة على مستوى الثابتات: يلاحظ أن للمجموعتين نفس المنوال ونفس الوسط الحسابي. تختلف المجموعتان P_1

وبثباته التبدد (الانحراف المعياري) حيث أنها أصغر عند المجموعة P_2

إذن المجموعة P_2 أكثر تجانساً من المجموعة P_1

- يلاحظ أن للمجموعتين نفس المعدل الحسابي الذي هو حصيلة قيمة زيادة الوزن على مجموع الأفراد أي متوسط زيادة الوزن عند كل فرد، وعليه فللمجموعتين نفس المردودية

التمرين الرابع (5 نقط)

تردد الأنماط الوراثية وتردد الحليلات:

$$f(aa)=q^2=256/1600=0.16$$

$$f(a)=q=\sqrt{0.16}=0.4$$

$$f(A)=p=1-q=1-0.4=0.6$$

$$f(AA)=p^2=(0.6)^2=0.36$$

$$f(Aa)=2pq=2.(0.4).(0.6)=0.48$$

المجموعة 1 متشابهة للاقتران، تقابل الأفراد AA ، وتقابل المجموعة 3 المتشابهة للاقتران الأفراد aa . بينما تقابل المجموعة

2، التي تتضمن حليلين مختلفين، الأفراد المختلفون للاقتران Aa الترددات الحليلية انطلاقاً من نتائج الهجرة الكهربائية:

$$f(A) = p = (AA + \frac{1}{2}Aa)/N = (38+47/2)/100 = 61.5/100 = 0.615 \quad p = 0.615$$

$$f(a) = q = (aa + \frac{1}{2}Aa)/N = (15+47/2)/100 = 38.5/100 = 0.385 \quad q = 0.385$$

الأعداد المنتظرة	النسب المنتظرة	الأعداد الملاحظة	الأنماط الوراثية
$n_1=p^2N=37.8$	$p^2=(0.615)^2=0.378$	38	AA
$n_2=2pqN=47.4$	$2pq=2 \times 0.615 \times 0.385=0.474$	47	Aa
$n_3=q^2N=14.8$	$q^2=(0.385)^2=0.148$	15	aa

- إن النتائج النظرية مطابقة للنتائج الملاحظة ، فالساكنة متوازنة.