



الصفحة

1  
1

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة العادية 2012

### عناصر الإجابة

المملكة المغربية



وزارة التربية الوطنية

المركز الوطني للتقديم والامتحانات

7	المعامل	NR32	علوم الحياة والأرض	المادة
3	مدة الإنجاز		شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض	الشعبية أو المسلك

النقطة	عنصر الإجابة	السؤال
	التمرين الأول (4 نقط)	

0.5	• <b>شكل وأصل المفاويات T:</b> - تتشكل المفاويات T على مستوى النخاع العظمي انطلاقا من خلايا أم للمفاويات. - يتم نضج المفاويات T في الغدة السعوية حيث تكتسب كفایتها المناعية.
0.5	• <b>دور المفاويات T<sub>4</sub> خلال طوري الحث والتضخم:</b>  - خلال طور الحث: ✓ أثناء مرحلة التعرف تقوم الخلايا العارضة لمولد المضاد بعرض المحددات المستضدية للمفاويات T <sub>4</sub> بواسطة جزيئات CMH II يتم التعرف الثاني بواسطة المستقبلات الغشائية ✓ أثناء مرحلة التنشيط: يحدث تبادل للوسائط المناعية بين المفاويات T <sub>4</sub> والخلايا العارضة لمولد المضاد تحول T <sub>4</sub> إلى T <sub>h</sub> التي تنشط المفاويات T <sub>8</sub> النوعية عن طريق IL <sub>2</sub> .
0.25	- خلايا طور التضخم: ✓ في مرحلة التكاثر: تفرز T <sub>h</sub> الذي ينشط تكاثر T <sub>8</sub> ✓ في مرحلة التفريق: تحول T <sub>8</sub> إلى T <sub>c</sub> قاتلة عن طريق IL <sub>2</sub> .
0.25	• <b>دور المفاويات T<sub>8</sub> في طور التبني:</b> يتم القضاء على الخلايا الهدف عن طريق ظاهرة السمية الخلوية وفق المراحل الآتية: - تعرف ثانوي لـ T <sub>c</sub> على الخلايا الهدف التي تعرض المحددات المستضدية عن طريق I CMH I - تنشيط إفراز البرفوريين والثواريزيم من طرف الخلايا T <sub>c</sub> - إحداث ثقوب بواسطة البرفوريين على مستوى غشاء الخلية الهدف - دخول الكريازيم إلى الخلية الهدف وتدمير ADN ثم موت الخلية الهدف (ملحوظة: يمكن قبول دخول الماء والأملاح المعدنية وانفجار الخلية الهدف)
0.25	

## التمرين الثاني (3.5 نقط)

0.5	- <b>في الوسط حي هوائي:</b> تتميز الخلايا بكبر قد الميتوكندريات ونمو الأعرااف عكس الوسط حي لا هوائي	1
0.25	- <b>في الوسط 1:</b> يبقى تركيز الأوكسجين مستمرا طيلة مدة التجربة	2
0.25	- <b>في الوسط 2:</b> ينخفض تركيز الأوكسجين حسب الزمن	
0.25	- استنتاج: الميتوكندريات مسؤولة عن استهلاك الأوكسجين ( التنفس الخلوي)	

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال										
0.25	- يرتفع تركيز $H^+$ بشكل فوري ثم ينخفض بشكل تدريجي إلى أن ينعدم ..... - يرتفع تركيز ATP بشكل سريع في المرحلة الأولى ويستمر ه ذا الارتفاع بشكل بطيء في المرحلة الثانية..... - يؤدي وجود الأوكسجين في الوسط إلى ارتفاع تركيز $H^+$ في الوسط وتركيب ATP ..... - بعد إضافة الأوكسجين للوسط:	3										
0.25	عند إضافة الأوكسجين للوسط يتم: - تشطط أكسدة المركبات المختزلة على مستوى السلسلة التنفسية..... - انتقال الإلكترونات على طول السلسلة التنفسية إلى المتقبل النهائي (الأوكسجين)..... - ضخ $H^+$ من الماتيريس إلى الحيز البيغشاني، تكون ممال $H^+$ (ارتفاع تركيز $H^+$ في الوسط)..... - عودة $H^+$ عبر الكرات ذات الشمراخ إلى الماتيريس مما يؤدي إلى انخفاض تركيز $H^+$ ..... - تركيب ATP انطلاقاً من ADP و Pi عن طريق الكرات ذات الشمراخ.....	4										
0.25	<b>التمرين الثالث (3.5 نقط)</b>											
0.25	- الحاليل المسؤول عن المرض متاح: إنجاب أبناء مصابين من آباء سليمين..... - الحاليل المسؤول عن المرض غير مرتبط بالصبغي الجنسي Y لوجود إناث وذكور مصابين..... - الحاليل المسؤول عن المرض غير مرتبط بـ الصبغي الجنسي X : إنجاب بنت مصابة $II_2$ من أبي سليم $I_1$ رغم أن الحاليل الممرض متاح ..... <b>(ملحوظة: في حالة إجابة التلميذ بأن المرض غير مرتبط بالجنس لكنه يصيب الجنسين معاً تمنح له 0.25 نقطة)</b>	1										
0.25	- النمط الوراثي $I_1$ و $III_2$ و $III_3$ و N//d .....  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">♂</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">♀</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">N/ (1/2)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">d/ (1/2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">N/ (1/2)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">N//N (1/4)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">N//d (1/4)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">d/ (1/2)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">N//d (1/4)</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">d//d (1/4)</td> </tr> </table>	♂	♀	N/ (1/2)	d/ (1/2)	N/ (1/2)	N//N (1/4)	N//d (1/4)	d/ (1/2)	N//d (1/4)	d//d (1/4)	2
♂	♀		N/ (1/2)	d/ (1/2)								
	N/ (1/2)	N//N (1/4)	N//d (1/4)									
d/ (1/2)	N//d (1/4)	d//d (1/4)										
0.25	- احتمال إنجاب طفل مصاب هو: 1/4.....											
0.5	- بالنسبة لجزء الأنسولين العادي:  ARN <sub>m</sub> : GGC-UUC-UUC-UAC-ACU-CCU-AAG-ACU Gly -Phe -Phe -Tyr -Thr -Pro -Lys -Thr	3										
0.5	- بالنسبة لجزء الأنسولين غير العادي:  ARN <sub>m</sub> : GGC-CUC-UUC-UAC-ACU-CCU-AAG-ACU Gly -Leu -Phe -Tyr -Thr -Pro -Lys -Thr											
0.25	- طفرة الاستبدال A ب G على مستوى الثلاثية 24 ..... - إدماج الحمض الأميني Leu على مستوى السلسلة البيبتيدية b للأنسولين غير العادي عوض Phe ..... هناك علاقة مورثة - بروتين.....											
0.25	- تركيب أنسولين غير عادي لا يثبت على مستقبلاته النوعية مما يؤدي إلى ظهور مرض السكري: علاقة بروتين - صفة											
0.5												

النقطة	عنصر الإجابة	السؤال																				
	التمرين الرابع (6 نقط)																					
0.25	<p><b>التزاوج الأول:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أفراد <math>F_1</math> متجانرون، إذن تحقق القانون الأول لماندل.</li> <li>- سيادة الحليل المسؤول عن الزغب الأسود على الحليل المسؤول عن الزغب المرقط.</li> </ul> <p>سيادة الحليل المسؤول عن عدم قابلية الزغب للتساقط على الحليل المسؤول عن قابلية الزغب للتساقط.</p>	1																				
0.25	<p><b>التزاوج الثاني:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- يعطي أربعة مظاهر خارجية مختلفة بنسب مقاومة حيث نسبة المظاهر الأبوية تفوق نسبة المظاهر الجديدة التركيب (<math>TP = 90.16\% &gt;&gt; TR = 9.83\%</math>)</li> <li>- إذن المورثتان المدروسان مرتبثان.</li> </ul>																					
0.25	<p><b>التفسير الصبغى:</b></p> <p><b>النمط الوراثي:</b></p> <p><b>الأم شاج:</b></p>																					
0.25	<p><b>النمط الوراثي:</b></p> <table border="1"> <tr> <td><math>N \quad H</math> 48%</td> <td><math>N \quad h</math> 5.46%</td> <td><math>n \quad H</math> 4.37%</td> <td><math>n \quad h</math> 42%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>N \quad H</math></td> <td><math>N \quad h</math></td> <td><math>n \quad H</math></td> <td><math>n \quad h</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48%</td> <td>5.46%</td> <td>4.37%</td> <td>42%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>[N,H]</math></td> <td><math>[N,h]</math></td> <td><math>[n,H]</math></td> <td><math>[n,h]</math></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>الأم شاج:</b></p>	$N \quad H$ 48%	$N \quad h$ 5.46%	$n \quad H$ 4.37%	$n \quad h$ 42%		$N \quad H$	$N \quad h$	$n \quad H$	$n \quad h$		48%	5.46%	4.37%	42%		$[N,H]$	$[N,h]$	$[n,H]$	$[n,h]$		
$N \quad H$ 48%	$N \quad h$ 5.46%	$n \quad H$ 4.37%	$n \quad h$ 42%																			
$N \quad H$	$N \quad h$	$n \quad H$	$n \quad h$																			
48%	5.46%	4.37%	42%																			
$[N,H]$	$[N,h]$	$[n,H]$	$[n,h]$																			
0.5	<table border="1"> <tr> <td><math>N \quad H</math> 48%</td> <td><math>N \quad h</math> 5.46%</td> <td><math>n \quad H</math> 4.37%</td> <td><math>n \quad h</math> 42%</td> <td><math>\♂</math></td> </tr> <tr> <td><math>N \quad H</math></td> <td><math>N \quad h</math></td> <td><math>n \quad H</math></td> <td><math>n \quad h</math></td> <td><math>\♀</math></td> </tr> <tr> <td>48%</td> <td>5.46%</td> <td>4.37%</td> <td>42%</td> <td></td> </tr> <tr> <td><math>[N,H]</math></td> <td><math>[N,h]</math></td> <td><math>[n,H]</math></td> <td><math>[n,h]</math></td> <td></td> </tr> </table> <p>إذن النتائج التجريبية تطابق النتائج النظرية.</p>	$N \quad H$ 48%	$N \quad h$ 5.46%	$n \quad H$ 4.37%	$n \quad h$ 42%	$\♂$	$N \quad H$	$N \quad h$	$n \quad H$	$n \quad h$	$\♀$	48%	5.46%	4.37%	42%		$[N,H]$	$[N,h]$	$[n,H]$	$[n,h]$		
$N \quad H$ 48%	$N \quad h$ 5.46%	$n \quad H$ 4.37%	$n \quad h$ 42%	$\♂$																		
$N \quad H$	$N \quad h$	$n \quad H$	$n \quad h$	$\♀$																		
48%	5.46%	4.37%	42%																			
$[N,H]$	$[N,h]$	$[n,H]$	$[n,h]$																			

النقطة	عناصر الاجابة	السؤال
0.25	- المورثتان مرتبتان تطابق الوثيقة 1 الشكل (أ) ..... - نسبة التركيبات الجديدة تساوي 9.83 % ← ← ما يتطابق مع الشكل (أ) من الوثيقة 1 حيث المسافة الفاصلة بين المورثتين تساوي 9.83 cMg	2
0.25	- ظهور مظاهر جديدة التركيب مرتبط بحدوث عبور صبغي لدى أفراد $F_1$ وهو ما يتطابق مع الشكل (ب) من الوثيقة 1	
0.25	<b>الوثيقة 2:</b> - في منطقة الصخور الفاتحة: عدد الفتران ذات المظهر الخارجي الفاتح يفوق بكثير عدد الفتران ذات المظهر الداكن..... - في منطقة الصخور الداكنة: عدد الفتران ذات المظهر الخارجي الداكن يفوق بكثير عدد الفتران ذات المظهر الداكن الفاتح	3
0.25	<b>الوثيقة 3:</b> - في منطقة الصخور الفاتحة: نسبة الحليل d المسئولة عن اللون الفاتح مرتفعة مقارنة مع الحليل D المسئولة عن اللون الداكن..... - في منطقة الصخور الداكنة: نسبة الحليل D المسئولة عن اللون الداكن مرتفعة مقارنة مع الحليل d المسئولة عن اللون الفاتح	
0.5	- في منطقة الصخور الفاتحة: تكون الفتران ذات المظهر الخارجي الداكن أكثر عرضة للافتراس من طرف البومه الصمuae بعكس الفتران ذات المظهر الفاتح، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الفتران ذوي المظهر الخارجي الفاتح؛ إذن الوسط يمارس انتقاء تفضيليا (إيجابيا) بالنسبة لهذا المظهر وبالتالي ارتفاع تردد الحليل d	4
0.5	- في منطقة الصخور الداكنة: تكون الفتران ذات المظهر الخارجي الفاتح أكثر عرضة للافتراس من طرف البومه الصمuae بعكس الفتران ذات المظهر الداكن مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الفتران ذوي المظهر الخارجي الداكن؛ إذن الوسط يمارس انتقاء تفضيليا بالنسبة لهذا المظهر ← ارتفاع تردد الحليل D المسئول عن اللون الداكن.....	
<b>التمرين الخامس (3 نقط)</b>		
0.25	- بالنسبة للبنية: نمر من البنية الشيسية بالنسبة للميكاشيس إلى البنية المورقة بالنسبة للغليس . (يمكن قبول بنية مورقة بالنسبة للميكاشيس) - بالنسبة للتركيب العيداني: اختفاء معدن الكلوريت؛	1
0.5	ظهور معادن جديدة كالثورديبرت والفلدسبات والسليمانيت - إذن عند المرور من الميكاشيس إلى الغليس هناك تغيرات بنوية وعيدانية وبالتالي المنطقة خضعت لظاهرة التحول.....	
0.25	- حدود اختفاء الكلوريت: درجة الحرارة من $350^{\circ}\text{C}$ إلى $450^{\circ}\text{C}$ تقريبا .. - حدود ظهور الكورديبيت: درجة الحرارة من $500^{\circ}\text{C}$ إلى $680^{\circ}\text{C}$ تقريبا .. - حدود ظهور الفلدسبات: درجة الحرارة من $620^{\circ}\text{C}$ إلى $880^{\circ}\text{C}$ تقريبا .. إذن كلما انتقلنا من الصخرة R إلى الصخرة G تزداد درجة الحرارة ..	2
0.25	كلما انتقلنا من الصخرة R إلى الصخرة G تزداد شدة التحول، وفي أقصى ظروف التحول تخضع الصخور المتحولة لانصهار جزئي معطية سائلا له تركيب كرانيتي،.....	3
0.25	عند تصلبه يبقى مرتبطا مع مادة لم تتصهر بعد (العنایس) مشكلة الميكمايات	



الصفحة  
1  
1

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة الاستدراكية 2012

### الموضوع

المملكة المغربية



وزارة التربية الوطنية  
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

7	المعامل	RS32	علوم الحياة والأرض	المادة
3	مدة الإنجاز		شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض	الشعب(ة) أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة

#### التمرين الأول (4 نقط)

خلال التقلص العضلي تستهلك الألياف العضلية ATP كمصدر للطاقة، ولتجديدها تعتمد هذه الألياف على طرق هوائية وأخرى لا هوائية تصاحب بتحرير حرارة في شكل نص واضح ومنظم:

- عرف كلا من التنفس والتلخر؛ (1 ن)

- حدد طرق تجديد ATP اللازمة للتقلص العضلي (اقتصر على التفاعلات الأساسية)؛ (1 ن)


- اذكر الظواهر الحرارية المرافقة للتقلص العضلي محددا خصائصها ومصدرها. (2 ن)

#### التمرين الثاني (3 نقط)


لدراسة بعض المظاهر المرتبطة بنقل الخبر الوراثي من خلية إلى أخرى وبكيفية تعبيره نقترح المعطيات الآتية:

• يمثل شكلان الوثيقة 1 طورين من أطوار الانقسام غير المباشر عند خلية حيوانية:

الشكل (ب)



الشكل (أ)



الوثيقة 1

1. حدد الطور الممثل في كل شكل من الشكلين (أ) و (ب). علل إجابتك. (1 ن)

2. أجز رسمًا تخطيطيًّا بفسر التطور الممثل في الشكل (ب) مستعملا الصيغة الصبغية:  $4 \cdot 2n = 0.5$  ن

• يتم تنشيط الانقسام الخلوي بواسطة بروتين غشائي يسمى RAS الذي يحفز مضاعفة ADN، يتوقف هذا الانقسام بفضل بروتين نووي يدعى P53 ، وذلك عن طريق كبح RAS. في الحالة التي يكون P53 غير فعال تتنقسم الخلايا بشكل مستمر وعشوائي، وبالتالي تظهر الخلايا السرطانية.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 جزءاً من قطعة ADN القابلة للنسخ المسئولة عن تركيب P53 العادي ، ويمثل الشكل (ب) جزءاً من قطعة ADN القابلة للنسخ المسئولة عن تركيب P53 غير الفعال.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T	C	A	C	T	T	C	C	G	A	T

منحي القراءة

الشكل (ب)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T	C	A	C	T	A	T	C	C	G	A	T

منحي القراءة

الشكل (أ)

## الوثيقة 2

الحمض الأميني	الوحدة الرمزية
لوسين Leu	CUC CUA
أرجينين Arg	AGA AGG
غليسين Gly	GGU GGC
حمض أسبارتيك ac.Asp	GAU GAC
حمض الكلوتاميك ac.Glu	GAA GAG
سيردين Ser	AGU AGC

## الوثيقة 3

3. باستعمال مستخرج جدول الرمز الوراثي الممثل في الوثيقة 3 أعط السلسلة الببتيدية لكل من P53 العادي و P53 غير الفعال، ثم حدد سبب الاختلاف بينهما مفسرا ظهور الخلايا السرطانية. (1.5 ن)

## التمرين الثالث (5 نقاط)

لدراسة انتقال بعض الصفات الوراثية عند ذبابة الخل، وتتأثير بعض عوامل التغير الوراثي على البنية الوراثية لساكناتها، نقترح المعطيات الآتية:

- التزاوج الأول: بين سلالتين نقيتين من ذبابة الخل: سلالة ذات **أجنحة طويلة** و **عيون حمراء**، وأخرى ذات **أجنحة أثرية** و **عيون أرجوانية**. أعطى هذا التزاوج جيلا (F<sub>1</sub>) يتكون من ذبابات خل ذات **أجنحة طويلة** و **عيون حمراء**.
- التزاوج الثاني: بين إناث من F<sub>1</sub> وذكور **بأجنحة أثرية** و **عيون أرجوانية**. أعطى هذا التزاوج جيلا (F<sub>2</sub>) موزع كما يلي:

- 1339 ذبابة خل **بأجنحة طويلة** و **عيون حمراء**؛

- 1195 ذبابة خل **بأجنحة أثرية** و **عيون أرجوانية**؛

- 151 ذبابة خل **بأجنحة طويلة** و **عيون أرجوانية**؛


- 154 ذبابة خل **بأجنحة أثرية** و **عيون حمراء**.

1. فسر نتائج التزاوجين الأول والثاني. (2.25 ن)

(أرمز للمورثة المسئولة عن طول الأجنحة بـ L و l، وللمورثة المسئولة عن لون العيون بـ R و r).

2. فسر مستعينا برسوم تخطيطية ظهور المظاهر الخارجية جديدة التركيب في الجيل  $F_2$ . (0.75 ن)

- نتتبع عند ساكنة معينة من ذبابة الخل مورثة مسؤولة عن شكل الأجنحة. لهذه المورثة حللان: الحليل السائد (نرمز له  $A$ ) مسؤول عن أجنحة مقورة، والحليل المترافق (نرمز له  $a$ ) مسؤول عن أجنحة عادية. بتبيين الوثيقة 1، تردد الأنماط الوراثية في هذه الساكنة قبل الانتقاء وبعده ، وتمثل الوثيقة 2 القطرور النظري لتردد النمطين الوراثيين  $a//a$  و  $A//A$  لذبابات خل بالغة.  
**(ملحوظة:** يموت أفراد الساكنة ذوو النمط الوراثي  $A//A$  قبل البلوغ).



		تراثية الأنماط الوراثية
بعد الانتقاء	قبل الانتقاء	الوثيقة 2
0	0	$A//A$
0.50	0.33	$a//a$
0.5	0.67	$a//A$


3. أحسب تردد الحليلين  $A$  و  $a$  في الساكنة قبل الانتقاء وبعده. (1 ن)

4. انطلاقا من الوثيقة 2 صف تطور تردد كل من النمط الوراثي  $a//a$  والنمط الوراثي  $A//a$  ثم حدد معللا إجابتك، تأثير الانتقاء الطبيعي على كل من الحليلين  $a$  و  $A$  . (1 ن)

#### التمرين الرابع ( 4 نقط)

تنتج الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة عن مهاجمة فيروس VIH لبعض الخلايا المناعية ودميرها ، مما ينجم عنه قصور في النظام المناعي. غير أن بعض الأشخاص (حالات نادرة) لا يتكاثر لديهم فيروس VIH رغم تعرضهم المتكرر له. لفهم آليات حدوث هذه الخاصية عند هؤلاء الأشخاص نقترح المعطيات الآتية:  
تمثل الوثيقة 1 تطور تركيز كل من المقاويات  $T_4$  و  $T_8$  ومضادات الأجسام، وكذا الحمولة الفيروسية لـ VIH في الدم.


1. انطلاقاً من الوثيقة 1 استخرج، معملاً إجابتك أنواع الاستجابة المناعية المتدخلة إثر الإصابة بفيروس VIH. (1ن)



2. بالاعتماد على الوثيقة 1 حدد تأثير العدو ب VIH على تطور كل من المفاويات  $T_4$  و  $T_8$ ، وعلى مضادات الأجسام، ثم فسر مستعيناً بمكتسباتك العلاقة بين تعفن المفاويات  $T_4$  ب VIH و ظهور الأمراض الانتهائية . (1.5ن)


في الحالة العادية يهاجم فيروس VIH الخلية المفاوية  $T_4$  وفق المراحل المبيبة في الشكل (أ) من الوثيقة 2، ويمثل الشكل (ب) من الوثيقة نفسها سلوك هذا الفيروس اتجاه المفاويات  $T_4$  عند الأشخاص الذين لا يتكاثر لديهم هذا الفيروس.

3. انطلاقاً من الشكل (أ) حدد آلية مهاجمة VIH للمفاويات  $T_4$  في الحالة العادية، و باعتماد الشكل (ب) فسر عدم إصابة بعض الأشخاص بالعدوى. (1.5 ن)




### التمرين الخامس (3 نقط)

تشكلت جبال الألب نتيجة اصطدام الصفيحتين الأوروبية والأفريقية بعد انغلاق المحيط الألبي الذي كان يفصل بينهما، ولربط تشكيل هذه السلسلة بحركة الصفائح نقترح نتائج بعض الدراسات:  
تقدم الوثيقة 1 مقطعاً جيولوجياً مبسطاً لجزء من سلسلة جبال الألب.



1. باستغلال معطيات الوثيقة 1، استخرج المؤشرات الدالة على أن المنطقة خضعت لقوى انضغاطية والمؤشر الدال على اختفاء مجال محيطي كان يفصل بين الصفيحتين القاريتين. (1ن)

- تحتوي صخور المركب الأوليفوليتي الموجودة بهذه السلسة على معادن مؤشرة تسمح بتحديد ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي كانت سائدة خلال بعض مراحل تشكيل جبال الألب. تقدم الوثيقة 2 المجموعات العيدانية لثلاث عينات من صخور الميتاكاربورو (كابرو متحول): MG1 و MG2 و MG3 أخذت من المنطقة المدرosa، وتقدم الوثيقة 3 مجالات استقرار مختلف التجمعات العيدانية والسعنات التحولية بدلالة درجة الحرارة والضغط والعمق.



التركيب العيداني	صخور الميتاكاربورو
- بلاجيوكلاز - أكتينوت - كلوريت	MG1
- كلوكوفان - فلادسبات - إيبودويت	MG2
- بجادي - جادييت	MG3

الوثيقة 2

الوثيقة 3

2. بالاعتماد على الوثيقة 3، حدد السعنات التي تتنمي إليها صخور الميتاكاربورو الثلاثة الممثلة في الوثيقة 2، ثم بين كيف يتغير الضغط ودرجة الحرارة عند الانتقال من الصخرة MG1 إلى الصخرة MG2 ثم من الصخرة MG2 إلى الصخرة MG3 محدداً نوع التحول الذي خضعت له هذه الصخور. (1.25 ن)
3. معتمداً على المعطيات السابقة ومكتسباتك، بين مراحل تشكيل سلسلة جبال الألب. (0.75 ن)