

**الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادلة 2019
- الموضوع -**

+٢٣٦٨٤٤١ ٩٦٤٠٤٠
+٩٦٦٥٦٧٤ ٨٥٧٤٤٠٤٨٠
٨ ٩٣٨٤٧٤ ٦٣٩٣٦٥
٨ ٩٥٦١٨ ٦٣٩٣٦٥



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
و التعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

NS36

2	مدة الاجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية (أ)	الشعبة أو المسلك

**يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة
المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)**

I- أجب (أجيبي) على ورقة تحريرك عن السؤالين الآتيين :

- 1- أعط (ي) مضمون قانون Hardy-Weinberg. (1 ن)
2- ذكر(ي) أربع مميزات لساكنة النظرية المثلية. (1 ن)

II- يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4.

أنقل (ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك ثم اكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح. (2 ن)

(3، (4)، (2)، (1)، (1))

3 - داخل ساكنة تخضع لقانون Hardy-Weinberg ، وفي حالة مورثة محمولة على الصبغي X ، تردد الأنماط الوراثية: أ- يعادل تردد الحليلات عند كل من الذكر والأنثى؛ ب- يعادل تردد الحليلات عند الذكر؛ ج- يعادل تردد الحليلات عند الأنثى؛ د- مستقل عن تردد الحليلات عند كل من الذكر والأنثى.	1- حسب قانون ساكنة Hardy-Weinberg ، يفيد ثبات ترددات حليلين ، لصفة وراثية كمية ، داخل ساكنة طبيعية أن: أ- الساكنة غير متوازنة من جيل لآخر بالنسبة لهذه الصفة؛ ب- الساكنة متوازنة ، من جيل لآخر ، بالنسبة لهذه الصفة؛ ج- التزاوجات بين أفراد الساكنة ، تمت بشكل تفاضلي؛ د- التزاوجات تمت بين أفراد ينتمون لأجيال مختلفة.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- الانتقاء الطبيعي آلية: أ- تؤدي إلى انتقال حليلات بشكل تفاضلي من جيل لآخر؛ ب- مستقلة عن ظروف العيش في الوسط وخصوصية أفراد الساكنة ؛ ج- تطال الفرد الواحد من أفراد الساكنة لا مجموع أفرادها؛ د- ينتج عنها تخليط وراثي يؤدي إلى تجانس أفراد الساكنة.	2- المحتوى الجيني لساكنة هو مجموع الحليلات: أ- التي تحتل موقع مختلف مورثات أفراد الساكنة؛ ب- السائدة التي تحتل موقع مختلف مورثات أفراد الساكنة؛ ج- الطافرة التي تحتل موقع مختلف مورثات أفراد الساكنة؛ د- المميئية التي تحتل موقع بعض مورثات أفراد الساكنة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III- يتضمن الجدول أسفله مجموعتين: تمثل المجموعة 1 طفرات صبغية، بينما تقدم المجموعة 2 مميزاتها. أنقل (ي) على ورقة تحريرك الأزواج الآتية وانسب (ي) لكل رقم من المجموعة 1 الحرف الذي يناسبه من المجموعة 2. (1 ن)


(1، (1)، (2)، (3)، (4))

المجموعة 2	المجموعة 1
أ- فقدان جزء من صبغي.	1. مضاعفة
ب- تبادل قطع بين صبغيين غير متماشين.	2. انتقال متبادل
ج- وجود نسخة مزدوجة من قطعة صبغية.	3. تعاكس
د- كسر في نفس الصبغي والتحام، بعد تعاكس قطعة.	4. ضياع

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبيانى (15 نقطة)

التمرين الأول: (3 نقط)

للكشف عن كيفية انتقال مرض وراثي عند الإنسان، وتفسير عواقب شذوذ صبغى على المظهر الخارجى، نقترح الآتى:




- يمثل داء السكري من النمط 1 (Diabète de type 1) المرتبط بالأنسولين 5% إلى 10% من مجموع حالات داء السكري. يظهر هذا المرض في غالب الأحيان أثناء الطفولة أو المراهقة.

تمثل الوثيقة 1 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض.

- ١ - أ- بين (ي) معللاً (معللة) إجابتك، أن الحليل المسؤول عن المرض متفح. (٠.٥ ن)

ب- أبرز (ي) ما إذا كانت المورثة محمولة على صبغى جنس أو صبغى لا جنسى. (٠.٥ ن)



- بعد از دیدار مولود مصاب بمرض وراثي، عند أقارب العائلة الممثلة في الوثيقة 1، نصح طبيب الزوجين (IV_2 , IV_3) غير المصابين بهذا المرض والذين ينتظران مولوداً جديداً بإجراء تشخيص قبل ولادي عبر إنجاز خرائط صبغية لأشهر العائلة.

تمثل الوثيقة 2 أزواج الصبغيات المتماثلة 5 و 12 عند أفراد العائلة الثلاثة.

ملحوظة: أزواج الصبغيات المتماثلة الأخرى عادية عند هؤلاء الأفراد.

- ### 3 – استناداً إلى الوثيقة 2 ومعارفك:

- أ- استخرج (ي) معللاً (معللة) إجابتك للأفراد الحاملين لشذوذ صبغى. (0.5 ن)

ب- أوجد (ي) العلاقة بين كل شذوذ صبغي ملاحظ والمظهر الخارجي للأفراد الحاملين له. (0.5 ن)


التمرين الثاني : (12 نقطة)

للكشف عن دور الانقسام الاختزالي والإخصاب في ثبات الصيغة الصبغية وتتنوع المظاهر الخارجية عبر الأجيال، وكذا مميزات التغير الوراثي عند عباد الشمس، نقترح المعطيات الآتية:

I - ازهار عباد الشمس المزروع (*Helianthus annuus*) رؤيس يتألف من أزهار عديدة. في مركز الرؤيس أزهار أنبوية ثنائية الجنس تتدخل في التوالد، وفي محيطه توجد أزهار مُلَسَّنة عقيمة.

تعرض خلية أم لحبوب الراحتة، داخل الكيس اللقاحي للمبيض، لانقسام خلوي يعطي أربعة أبواغ مجهرية. تنقسم نواة كل بوج مجيري إلى نوتين. يتفرق كل بوج مجيري إلى حبة لراحتة تتكون من خلتين إحداهما إنباتية والأخرى توالية. تتشكل حبة الراحتة النبات المشيجي الذكري.

تخضع خلية أم، داخل البُيضة (ovule)، لانقسام خلوي يعطي أربع خلايا تضمحل ثلاثة منها وتتنمو واحدة تسمى البوغ الكبير. يتعرض هذا البوغ لثلاثة انقسامات غير مباشرة ويتفرق إلى كيس جنيني به ثلاث خلايا معاكسة وبيضة غير ملقحة (oosphere) وخلايتين مساعدتين ونواتين مركزيتين. يشكل الكيس الجنيني النبات المثيحي الأنثوي. تكون حبة اللقاح أنبوباً لاقحياً يخترق قلم الميسم ويفرغ حُبَّيْن مُهَبِّيْن في الكيس الجنيني. يتحد أحدهما مع البيضة غير الملقحة معطياً بيضة رئيسية تتطور إلى جنين. ويتحد الثاني مع النواتين المركزيتين لتكوين بيضة تابعة. تعطي الأزهار الخصبة للرؤس فَقيرات (akènes) تحتوي على بذور. في ظروف ملائمة تنبت البذرة وتعطي نبتة جديدة. تمثل الوثيقة 1 مراحل دورة النمو عند نبات عباد الشمس.



الوثيقة 1

- 1 - باستغلال المعطيات السابقة والوثيقة 1 :
- أ - حدد (ي) البنية (أو البنيات) الخلوية التي يحدث في مستوى الانقسام الاختزالي من جهة والإخلاص من جهة أخرى. (0.75 ن)
 - ب - علماً أن نبتة عباد الشمس المزروع لها 34 صبغياً، أعط (ي) الصيغة الصبغية للبيضة غير الملقحة والبيضة الرئيسية. (0.5 ن)
 - ج - أجز (ي) الدورة الصبغية لهذا النبات محدداً (محددة) نمطها. (0.75 ن)

II - عند نبات عباد الشمس، مكنت ملاحظات من الكشف عن زوجين من الحليات: زوج مسؤول عن لون السيقان (نباتات بسيقان حمراء ونباتات بسيقان خضراء) وزوج مسؤول عن خصوبة أو عقم الأسدية. من أجل دراسة كيفية انتقال هاتين الصفتين، تم إنجاز التزاوجات الآتية:

- **التزاوج الأول:** بين نباتات من سلالة نقية ذات سيقان حمراء وأسدية خصبية ونباتات من سلالة نقية ذات سيقان خضراء وأسدية عقيمة. بعد زرع البذور الناتجة عن هذا التزاوج، نحصل على جيل أول F_1 يتكون من نباتات جميعها ذات سيقان حمراء وأسدية خصبية.

- **التزاوج الثاني:** بين نباتات الجيل الأول F_1 ونباتات ذات سيقان حمراء وأسدية عقيمة. يعطي هذا التزاوج جيلا ثانيا F_2 يتكون من:

- 13 نبتة ذات سيقان حمراء وأسدية خصبية؛ - 485 نبتة ذات سيقان حمراء وأسدية عقيمة؛

- 11 نبتة ذات سيقان خضراء وأسدية عقيمة؛ - 491 نبتة ذات سيقان حمراء وأسدية خصبية.

2- باستغلال نتائج التزاوجين الأول والثاني، حدد (ي) كيفية انتقال الصفتين الوراثيتين المدروستين. (1.5 ن)
استعمل (ي) الرمزين (R أو r) بالنسبة للحليدين المسؤولين عن صفة "لون السيقان" والرمزين (F أو f) بالنسبة للحليدين المسؤولين عن صفة "خصوبة أو عقم الأسدية".

3- مستعينا بشبكة التزاوج، أعط (ي) التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني. (1.5 ن)

4- أنجز (ي) رسوما تخطيطية لمراحل الظاهرة التي حدثت عند أفراد الجيل F_1 وأدت إلى ظهور المظاهر الخارجية المحصلة في الجيل الثاني F_2 . (1 ن)

5- أنجز (ي) الخريطة العاملية للمورثتين المدروستين مبرزا مراحل هذا الإنجاز. (1 ن)
استعمل (ي): $1\text{cm} = 2\text{cm Mg}$.

III - عند نبات عباد الشمس *Helianthus annuus* ، تم قياس تغير الكتلة الجافة للفقيرات بـ cg في عينة تتكون من 350 فقيرة (Akène). تبيّن الوثيقة 2 النتائج المحصلة.

[56-60]	[51-55]	[46-50]	[41-45]	[36-40]	[31-35]	[26-30]	[21-25]	[16-20]	[11 -15]	[6 -10]	الكتلة الجافة للفقيرات بـ cg
الترددات											
21	34	58	41	27	16	30	37	49	24	13	

الوثيقة 2

6- أنجز (ي) مدرج ومضلع الترددات لتوزيع الكتلة الجافة للفقيرات بـ cg . (1 ن)

استعمل (ي) السلم: 1 cm لكل فئة و $1\text{cm} = 2\text{cm Mg}$ لكل 10 فقيرات.

7- أحسب (ي) قيم المعدل الحسابي والانحراف النمطي (المعياري) ومجال الثقة $[\bar{X} - \sigma, \bar{X} + \sigma]$ لهذا التوزيع باعتماد جدول تطبيقي لحساب الثابتات الإحصائية. (2.5 ن)
نعطي:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad \bar{x} = \frac{\sum_i (f_i x_i)}{n}$$

8- استنادا إلى ما سبق، استنتج (ي) مميزات هذا التغيير عند نبات عباد الشمس المدروس. علل (ي) إجابتك. (1.5 ن)

انتهى

**الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادلة 2019
- عناصر الإجابة -**

+٢٣٦٨٤٤١ ٩٦٤٠٤٠
٨٣٣٤٧٥٦ ٨٣٣٤٤٥٠
٨٣٣١٢٦ ٨٣٣٢٥٥٠



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعلم المالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

NR36

2 مدة الاجاز

علوم الحياة والأرض

المادة

3 المعامل

شعبة العلوم الرياضية : مسلك العلوم الرياضية (أ)

الشعبة أو المسلك

المكون الأول: استرداد المعرف (5 نقط)

سلم التقييم	عناصر الإجابة	رقم السؤال
1 ن	<p>1- قبول إجابة صحيحة من قبل: في ساكنة نظرية مثالية، تبقى ترددات الأنماط الوراثية وترددات الحليلات مستقرة من جيل إلى آخر (ما يفيد أن الساكنة في حالة توازن).</p> <p>2- ذكر أربع مميزات لساكنة نظرية مثالية من بين الآتي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ساكنة مكونة من عدد لا متناه من الأفراد؛ - ساكنة أفرادها شائعون الصبغة ذو توألد جنسي؛ - تزاوج عشوائي بين الأفراد: التقاء عشوائي للأمشاج؛ - ساكنة ذات أجيال غير متراكبة (غياب التزاوج بين أفراد أجيال مختلفة)؛ - غياب تدفقات ناتجة عن الهجرة: ساكنة معزولة وراثياً؛ - غياب طفرات (لا تحول من حالة حليلية نحو أخرى)؛ - غياب الانقاء: لأفراد الساكنة نفس القدرة على التزاوج وإعطاء خلف قادر على العيش. <p>(0.25 x 4).....</p>	I
2 ن	(2 ؛ ب) - (2 ؛ أ) (0.5 x 4).....	II
1 ن	(2 ؛ ب) - (2 ؛ ج) (0.25 x 4).....	III

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول: (3 نقط)

سلم التقييم	عناصر الإجابة	رقم السؤال
0.5 ن	<p>أ- الأبوان I₁ و I₂ سليمان وأنجبا طفلين مصابين II₂ و II₄ إذن الحليل المسؤول عن المرض متاح.....</p> <p>(0.25 x 2).....</p>	
0.5 ن	<p>ب- المورثة المسئولة عن المرض غير محمولة على الصبغي Y : II₂ بنت مصابة. المورثة المسئولة عن المرض غير محمولة على الصبغي X : II₂ بنت مصابة وأبوها سليم.</p> <p>(0.25).....</p> <p>ـ المورثة المسئولة عن المرض محمولة على صبغي لا جنسي.....</p> <p>قبول كل تعليل منطقي صحيح.</p>	1
1 ن	<p>النمط الوراثي للأفراد :</p> <p>I₁ : امرأة سليماء أنجبت طفلين مصابين (0.25).....</p> <p>II₃ : امرأة ذات مظاهر خارجي سليم، أنها ناقلة للمرض ولم تنجب بعد أطفالا، لديها احتمال 50% أن يكون نمطها الوراثي N//d و 50% أن يكون N//d (0.5).....</p> <p>IV₁ : فرد مصاب، متشابه الإقتران d//d (0.25).....</p>	2

ن 0.5	<p>أ- الأفراد الحاملون للشذوذ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأب: انتقال قطعة من الصبغي 5 وتموضعها على الصبغي 12 (انتقال صبغي متوازن); ... - الحميل: خريطته الصبغية تحمل قطعة إضافية من الصبغي 5 مثبتة على الصبغي 12 (انتقال صبغي غير متوازن). 	3
ن 0.5	<p>ب- يحمل الأب شذوذًا صبغيا، خريطته الصبغية عادية، مظهره الخارجي عاد.</p> <ul style="list-style-type: none"> - يحمل الحميل شذوذًا صبغيا، خريطته الصبغية غير عادية، سيكون مظهره الخارجي غير عاد (إصابة بالمرض الوراثي). 	(0.25 ن)


التمرين الثاني: (12 نقطة)

السؤال	عناصر الإجابة	سلم التقييم
I	<p>أ- يحدث الانقسام الاختزالي في مستوى الكيس اللقاحي وفي مستوى الببيضة..... (0.5 ن)</p> <p>- يحدث الإخصاب في مستوى الكيس الجنيني..... (0.25 ن)</p>	ن 0.75
I	<p>ب- الصيغة الصبغية للببيضة غير الملقحة: $n = 17$ (0.25 ن)</p> <p>- الصيغة الصبغية للببيضة الرئيسية: $2n = 34$ (0.25 ن)</p>	ن 0.5
II	<p>ج- دورة صبغية صحيحة..... (0.5 ن)</p> <p>نمطها: أحادية - ثنائية الصيغة الصبغية..... (0.25 ن)</p>	ن 0.75
II	<p>التزاوج الأول:</p> <ul style="list-style-type: none"> - انتقال صفتين وراثيتين، هجونة ثنائية..... (0.25 ن) - الأبوان من سلالتين نقيتين، تجانس أفراد F_1 ، تحقق القانون الأول لماندل..... (0.25 ن) - أفراد الجيل الأول F_1 لهم مظهر خارجي يشبه مظهر أحد الأبوين: <ul style="list-style-type: none"> - الحليل المسؤول عن اللون الأحمر سائد نرمز له (R) والليل المسؤول عن اللون الأخضر متاح نرمز له (r)..... (0.25 ن) - الحليل المسؤول عن أسدية خصبية سائد نرمز له (F) والليل المسؤول عن أسدية عقيمة متاح نرمز له (f)..... (0.25 ن) <p>التزاوج الثاني:</p> <p>المورثان المدرóstان مرتبطان مع حدوث العبور..... (0.25 ن)</p> <p>- تعليل: الجيل F_2 ناتج عن تزاوج اختباري، يتكون من أربع مظاهر خارجية بحيث نسبة المظاهر الخارجية الأبوية تفوق نسبة المظاهر جديدة التركيب ($2.4\% < 97.6\%$) (0.25 ن)</p> 	ن 1.5

$\begin{array}{c} F_1 \\ [R,F] \\ \frac{RF}{rF} \\ rF \end{array} \times \begin{array}{c} \text{فرد ثانوي التحفي} \\ [r,f] \\ \frac{rf}{Rf} \\ Rf \end{array}$	التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني: المظاهر الخارجية : 0.25 ن الأنماط الوراثية : 0.25 ن الأمشاج: 0.25 ن شبكة التزاوج: 0.5 ن
$\begin{array}{ccccc} RF & & rF & & Rf \\ 48.5\% & & 49.1\% & & 1.3\% \\ \hline \gamma F_1 & & RF & & rF \\ \gamma & & 48.5\% & & 49.1\% \\ \hline rf & & [R,F] & & [r,F] \\ 100\% & & 48.5\% & & 1.3\% \\ \hline & & Rf & & Rf \\ & & r f & & r f \\ & & [R,f] & & [r,F] \\ & & 49.1\% & & 1.3\% \\ \hline & & Rf & & Rf \\ & & r f & & r f \\ & & [R,f] & & [r,F] \\ & & 1.1\% & & 49.1\% \end{array}$	الأمشاج: 0.25 ن شبكة التزاوج: 0.5 ن

المظاهر الخارجية للجيل الثاني F'_2 : $[R,F] 48.5\% ; [r,f] 49.1\% ; [r,F] 1.3\% ; [R,f] 1.1\%$

إنجاز رسوم تخطيطية لظاهرة العبور الصبغي ($0.25 \times 4 = 1$ ن)



ن 1

4

إنجاز الخريطة العاملية:

- حساب صحيح لنسبة التركيبات الجديدة ($P = 2.4\%$):

- تحديد المسافة بـ $d = 2.4 \text{ cMg}$ cMg :

- احترام السلم;

- موضعية صحيحة للمورثتين على الصبغي.

ن 1


5

إنجاز مدرج ومطلع ترددات صحيح وفق السلم المقترن في الموضوع. ($0.25 \times 4 = 1$ ن)

ن 1

6

III



جدول تطبيقي لحساب الثابتات الإحصائية صحيح:						
	$f_i (x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2$	$x_i - \bar{x}$	$f_i x_i$	f_i	وسط الفئة x_i
ن 2.5	9198.28	707.56	-26.6	104	13	8
	11197.44	466.56	-21.6	312	24	13
	13502.44	275.56	-16.6	882	49	18
	4978.72	134.56	-11.6	851	37	23
	1306.8	43.56	-6.6	840	30	28
	40.96	2.56	-1.6	528	16	33
	312.12	11.56	3.4	1026	27	38
	2892.96	70.56	8.4	1763	41	43
	10414.48	179.56	13.4	2784	58	48
	11511.04	338.56	18.4	1802	34	53
	11498.76	547.56	23.4	1218	21	58
	76854			12110	350	المجموع
	(ن 1.5).....					
	المعدل الحسابي: $\bar{X} = 34.6$ cg (ن 0.25).....					
ن 1.5	الانحراف النمطي (المعياري) $\sigma = 14.82$ (ن 0.5).....					
	مجال الثقة: [19.78, 49.42] (ن 0.25).....					
	يجب أن يتضمن الاستنتاج المميزات الآتية: - مضلع الترددات ثنائي المنوال :					
	• [16 - 20] أو الفئة 18cg (ن 0.25).....					
ن 8	• [46 - 50] أو الفئة 48 cg (ن 0.25).....					
	- عينة غير متجانسة (ن 0.5).....					
	- 73,71 % من الفقيرات تنتمي إلى المجال [19.78, 49.42] (ن 0.5).....					