

## النشر والتعميل

النشر : I

(1) - جداء عدد في مجموع وجاء عدد في فرق :

\* مثال 1 :

لحسب ثم نقارن العددين :  $B = 2 \times 5,5 + 2 \times 7,3$  و  $A = 2 \times (5,5 + 7,3)$

$$\begin{array}{ll} B = 2 \times 5,5 + 2 \times 7,3 & A = 2 \times (5,5 + 7,3) \\ = 11 + 14,6 & = 2 \times 12,8 \\ = 25,6 & = 25,6 \end{array} \quad \text{لدينا :}$$

نلاحظ أن :  $2 \times (5,5 + 7,3) = 2 \times 5,5 + 2 \times 7,3$  أي أن :  $A = B$

نقول أنشأنا نشرنا الجداء  $2 \times (5,5 + 7,3)$

\* مثال 2 :

لحسب ثم نقارن العددين :  $D = 6,5 \times 3 - 6,5 \times 7,5$  و  $C = 6,5 \times (3 - 7,5)$

$$\begin{array}{ll} D = 6,5 \times 3 - 6,5 \times 7,5 & C = 6,5 \times (3 - 7,5) \\ = 19,5 - 48,75 & = 6,5 \times (-4,5) \\ = -29,25 & = -29,25 \end{array} \quad \text{لدينا :}$$

نلاحظ أن :  $6,5 \times (3 - 7,5) = 6,5 \times 3 - 6,5 \times 7,5$  أي أن :  $C = D$

\* قاعدة 1 :

و  $x$  و  $y$  أعداد عشرية نسبية .

$$a(x - y) = a.x - a.y \quad \text{و} \quad a(x + y) = a.x + a.y$$

بتعبير آخر : النشر هو كتابة جداء على شكل مجموع أو فرق .

\* بصفة عامة :

و  $b$  و  $c$  و  $n$  أعداد عشرية نسبية .

$$n(a + b - c) = na + nb - nc$$

\* المجموع :  $a + a + a + a + a + \dots + a$

عدد عشري نسبي . A

$$a + a + a + a + \dots + a = n.a$$

من الحدود n

\* مثال :

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 6 \times 3 = 15$$
$$(-5) + (-5) + (-5) + (-5) = 4 \times (-5)$$

/ تمرين تطبيقي 1 :

a عدد عشري نسبي .

بسط مايلي :

$$A = 3a + 25a ; B = 3,5a + 2a + a$$

$$C = 7a - 3,5a ; D = -11,5a - 2,5a - a ; E = 21a - 3,5a + 5,5a$$

الحل :

$$A = 3a + 25a = 28a ; B = 3,5a + 2a + a = 6,5a$$

$$C = 7a - 3,5a = 3,5a ; D = -11,5a - 2,5a - a = -15a$$

$$E = 21a - 3,5a + 5,5a = 21a + 5,5a - 3,5a = 26,5a - 3,5a = 23a$$

/ تمرين تطبيقي 2 :

b و b عداد عشريان نسبيان .

بسط مايلي :

$$A = 2a + 3b - 5,5a + 7b ; B = a + b - 11b + 0,5a - 11$$

الحل :

$$A = 2a + 3b - 5,5a + 7b ; B = a + b - 11b + 0,5a - 11$$

$$= 2a - 5,5a + 3b + 7b = a + 0,5a + b - 11b - 11$$

$$= -3,5a + 10b = 1,5a - 10b - 11$$

- جداء مجموعين : (2)

\* قاعدة 2 :

و b و y أعداد عشرية نسبية :

$$(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by$$

$$\begin{aligned} (a + b)(x + y) &= a(x + y) + b(x + y) \\ &= (ax + ay) + (bx + by) \\ &= ax + ay + bx + by \end{aligned}$$

تقنيات :

\* مثال :

$$\begin{aligned}
 A &= (2 + x)(x + 6) \\
 &= 2(x + 6) + x(x + 6) \\
 &= (2x + 12) + (x^2 + 6x) \\
 &= 2x + 12 + x^2 + 6x \\
 &= 2x + 6x + x^2 + 12 \\
 &= 8x + x^2 + 12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= (-3 + x)(1 - x) \\
 &= -3(1 - x) + x(1 - x) \\
 &= -(3 - 3x) + (x - x^2) \\
 &= -3 + 3x + x - x^2 \\
 &= 3x + x - x^2 - 3 \\
 &= 4x - x^2 - 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C &= (-2x - 3)(-x - 5) \\
 &= -2x(-x - 5) - 3(-x - 5) \\
 &= -(2x^2 - 10x) - (-3x - 15) \\
 &= -2x^2 + 10x + 3x + 15 \\
 &= -2x^2 + 13x + 15
 \end{aligned}$$

## II التعميل :

(1) تعريف :

التعميل هو كتابة مجموع أو فرق على شكل جداء

• ملاحظة هامة : قبل أن نعمل ببحث عن العامل المشترك

- مثال (2) :

$$\begin{array}{lll}
 A = 6a + ax &; & B = a^2 + 3a &; & C = 2ax - 4ay \\
 &= a(6 + x) & &= a(a + 3) &= 2a(x - 2y)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 D = 5x^3 + 10x^2 - 20x &; & E = 2abx + 6aby - 2ab &; & F = 2x(1 + x) + 7(1 + x) \\
 &= 5x(x^2 + 2x - 4) & &= 2ab(x + 3y - 1) &= (1 + x)(2x + 7)
 \end{array}$$

## III النشر و التعميل و المتطابقات الهامة :

(1) خاصية : (المتطابقات الهامة)

**a و b عداد عشريان نسبيان :**

$$\begin{aligned}
 (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
 (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\
 (a - b)(a + b) &= a^2 - b^2
 \end{aligned}$$

## 2 - تطبيقات :

(أ) - لنشر ثم نبسط ما يلي :

$$\begin{aligned} (a + 3)^2 &; (x + y)^2 &; (2x + 1)^2 \\ (x - 5)^2 &; (2 - y)^2 &; (3x - 7)^2 \\ (x - 2)(x + 2) &; (6x + 1)(6x - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a + 3)^2 &= a^2 + 2 \cdot a \cdot 3 + 3^2 & (x + y)^2 &= x^2 + 2 \cdot x \cdot y + y^2 \\ &= a^2 + 6a + 9 & &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (2x + 1)^2 &= (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 1 + 1^2 & (x - 5)^2 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 \\ &= 4x^2 + 4x + 1 & &= x^2 - 10x + 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2 - y)^2 &= 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot y + y^2 & (3x - 7)^2 &= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 7 + 7^2 \\ &= 4 - 4y + y^2 & &= 9x^2 - 42x + 49 \end{aligned}$$

$$(x - 2)(x + 2) = x^2 - 2^2 \quad ; \quad (6x + 1)(6x - 1) = (6x)^2 - 1^2 \\ = x^2 - 4 \quad ; \quad = 36x^2 - 1$$

(ب) - لنعمل ما يلي :

$$\begin{aligned} A &= x^2 + 4x + 1 & B &= 25x^2 + 30x + 9 & C &= 49 - 28x + 4x^2 \\ D &= 9x^2 - 30x + 25 & E &= 4 - x^2 & F &= 81x^2 - 121 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= x^2 + 4x + 1 & B &= 25x^2 + 30x + 9 & C &= 49 - 28x + 4x^2 \\ &= x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 & &= (5x)^2 + 2 \cdot 5x \cdot 3 + 3^2 & &= 7^2 - 2 \cdot 7 \cdot 2x + (2x)^2 \\ &= (x + 2)^2 & &= (5x + 3)^2 & &= (7 - 2x)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 9x^2 - 30x + 25 & E &= 4 - x^2 & F &= 81x^2 - 121 \\ &= (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5 + 5^2 & &= 2^2 - x^2 & &= (9x)^2 - 11^2 \\ &= (3x - 5)^2 & &= (2 - x)(2 + x) & &= (9x - 11)(9x + 11) \end{aligned}$$