


A' و B' و C' هي صور A , B , C على التوالي.  
5 - التطبيقات السابقة تحافظ على الاستقامية ومعاملها وعلى المنتصف وعلى صور الأشكال ...

## تمارين وحلولها

### تمرين 1 :

- ABC مثلث قائم الزاوية في A .  
M نقطة تنتمي إلى القطعة [BC] .  
النقطة P ممتالة النقطة M بالنسبة للمستقيم (AB) و Q ممتالة M بالنسبة للمستقيم (AC) .  
(1) - بين أن النقط A و P و Q مستقيمة (باستعمال الثمائل المحوري) .  
(2) - باستعمال الثمائل المحوري بين أن A منتصف [PQ] .



### الجواب :

(1) - لدينا :  $S_{(AB)}(M) = P$

$S_{(AB)}(A) = A$

$S_{(AB)}(B) = B$

إذن صورة الزاوية  $\widehat{BAM}$  بـ  $S_{(AB)}$  هي الزاوية  $\widehat{BAP}$  .  
ومنه  $\widehat{BAM} = \widehat{BAP}$

لدينا كذلك :  $S_{(AC)}(A) = A$  و  $S_{(AC)}(C) = C$  و  $S_{(AC)}(M) = Q$

إذن صورة الزاوية  $\widehat{CAM}$  بـ  $S_{(AC)}$  هي الزاوية  $\widehat{CAQ}$  .

ومنه :  $\widehat{CAM} = \widehat{CAQ}$

وبما أن  $\widehat{BAM} + \widehat{CAM} = 90^\circ$  فإن  $\widehat{BAP} + \widehat{CAQ} = 90^\circ$

لدينا :  $\widehat{QAP} = \widehat{QAC} + \widehat{CAB} + \widehat{BAP}$

$= \widehat{QAC} + \widehat{BAP} + \widehat{CAB}$

$= 90^\circ + 90^\circ$

$= 180^\circ$

وبما أن التمثال المحوري يحافظ على المنتصف وبما أن I منتصف [AC] فإن I منتصف [A'C'] إذن [AC] و [A'C'] لهما نفس المنتصف I ومنه AC'CA متوازي الأضلاع. (1)

لدينا :  $S_{(BD)}(A') = A$  و  $S_{(BD)}(C) = C'$  إذن صورة المستقيم (A'C) بالتمثال المحوري  $S_{(BD)}$  هي المستقيم (AC').

وبما أن  $(AC') \parallel (A'C)$  فإن

$(A'C) \parallel (AC') \parallel (BD)$  وبما أن

$(CC') \perp (AC')$  و  $(CC') \perp (BD)$  فإن (2) من (1) و (2) فإن AC'CA' مستطيل.

### تمرين 3:

ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A.


نشئ خارج هذا المثلث : المثلثين المتساوي الأضلاع AB'C و AC'B.

(BB') و (CC') يتقاطعان في I و (B'C) و (BC') يتقاطعان في J.

(1) - أنشئ الشكل.

(2) - باستعمال تماثل محوري، بين أن I و J و A و مستقيمة.

### الجواب:



إذن النقط A و Q و P مستقيمة.

(2) - لدينا  $S_{(AB)}(A) = A$  و  $S_{(AB)}(M) = P$

إذن :  $AM = AP$  (1)

لدينا كذلك :  $S_{(AC)}(M) = Q$

و  $S_{(AC)}(A) = A$

إذن :  $AM = AQ$  (2)


من (1) و (2) نستنتج أن  $AP = AQ$

وبما أن A و P و Q مستقيمة فإن A منتصف [PQ].

### تمرين 2:

ليكن ABCD متوازي الأضلاع A' و B' على التوالي صورتا A و C بالتمثال المحوري الذي محوره (BD) بين أن AC'CA' مستطيل.

### الجواب:




لدينا ABCD متوازي الأضلاع ليكن I منتصف القطرين [AC] و [BD].

لدينا  $S_{(BD)}(A) = A'$  و  $S_{(BD)}(C) = C'$

و  $S_{(BD)}(I) = I$  لأن  $I \in (BD)$ .

لدينا  $S_{(\Delta)}(B) = C$  و  $S_{(\Delta)}(A) = A$  إذن صورة القطعة  $[AB]$  بـ  $S_{(\Delta)}$  هي القطعة  $[AC]$  وبما أن  $I$  منتصف  $[AB]$  و  $S_{(\Delta)}$  يحافظ على المنتصف فإن  $S_{(\Delta)}(I) = J$  ولدينا  $S_{(\Delta)}(B) = C$  أي أن  $S_{(\Delta)}(C) = B$  إذن  $CI = BJ$  لأن الثمائل المحوري يحافظ على المسافة.



(AC) محور ثمائل لـ ABCD إذن  $S_{(BD)}((AB)) = (AD)$

نضع :  $S_{(AC)}(H) = H'$

إذن  $H' \in (AD)$  ①

ولدينا :  $S_{(AC)}(M) = M$

و  $S_{(AC)}(A) = A$  و  $S_{(AC)}(H) = H'$

إذن صورة الزاوية  $\widehat{AHM}$  بـ  $S_{(AC)}$  هي الزاوية  $\widehat{AH'M}$ .

إذن  $\widehat{AH'M} = 90^\circ$  ②

من ① و ② نستنتج أن  $H' = K$  إذن

$S_{(AC)}(M) = M$  و  $S_{(AC)}(H) = K$

إذن  $MH = MK$  لأن الثمائل المحوري يحافظ على المسافة.

(2) - بما أن ABC مثلث متساوي الساقين في A فإن  $(\Delta)$  واسط القطعة  $[BC]$  هو محور ثمائل له. لدينا  $S_{(\Delta)}(B) = C$  و  $S_{(\Delta)}(B') = C'$  لأن  $ABB'$  و  $ACC'$  ممتثلان بالنسبة لـ  $(\Delta)$ . وبما أن  $(B'B) \cap (CC') = \{I\}$  فإن  $I \in (\Delta)$

لدينا كذلك  $S_{(\Delta)}(C) = B$  و  $S_{(\Delta)}(B') = C'$  إذن  $(CB')$  و  $(BC')$  ممتثلان بالنسبة لـ  $(\Delta)$  وبما أن  $(BC') \cap (B'C) = \{J\}$  فإن  $J \in (\Delta)$  ولدينا  $A \in (\Delta)$  إذن النقط A و I و J مستقيمة.

### تمرين 4 :


(1) - ABC مثلث متساوي الساقين في A و I منتصف  $[AB]$  و J منتصف  $[AC]$ .

باستعمال ثمائل محوري : بين أن  $BJ = CI$

(2) - ABCD معين و M نقطة تنتمي إلى  $[BC]$  و H و K هما على التوالي مسقطي M على المستقيمين  $(AB)$  و  $(AD)$  باستعمال ثمائل محوري بين أن  $MH = Mk$

### الجواب :

(1) - ABC مثلث متساوي الساقين في A . \* نعتبر  $(\Delta)$  محور ثمائله.



### تمرين 6:

A و B و C ثلاث نقط غير مستقيمة و M نقطة من (BC) مخالفة ل B و C .  $(\Delta)$  هو المستقيم الذي يمر من A ويوازي (BC).

المستقيم الموازي لـ (AB) و المار من M يقطع  $(\Delta)$  في D والمستقيم الموازي لـ (AC) و المار من M يقطع  $(\Delta)$  في E.


- (1) - أنشئ الشكل .
- (2) - لتكن I منتصف القطعة [AM].
- أ - حدد صورة المستقيمين (CA) و (CM) بـ  $S_I$ .

ب - استنتج صورة النقطة C بـ  $S_I$ .

(3) - بين أن :  $S_I(B) = D$

واستنتج أن  $(BE) \parallel (CD)$ .

### الجواب:



(2) - أ - لدينا I منتصف [AM].

$$S_I(A) = M$$


إذن صورة المستقيم (CA) هو المستقيم المار من M والموازي لـ (CA).

$$S_I((CA)) = (EM)$$

$$S_I(M) = A \quad \text{إذن} \quad S_I(A) = M$$

### تمرين 5:

نعتبر الشكل التالي :



أوجد نقطة A تنتمي إلى المستقيم  $(D_1)$  ونقطة B تنتمي إلى المستقيم  $(D_2)$  حيث :

$$B = S_{(\Delta)}(A)$$


### الجواب:

إذا كانت A تنتمي إلى  $(D_1)$  فإن  $S_{(\Delta)}(A)$  تنتمي إلى  $(D'_1)$  المستقيم حيث :

$$S_{(\Delta)}((D_1)) = (D'_1) \quad \text{أي أن} \quad B \in (D'_1) \quad \text{إذن}$$

B هي نقطة تقاطع  $(D_1)$  و  $(D_2)$ .

الإثناء :




نشئ  $(D'_1)$  مماثل  $(D_1)$  بالنسبة لـ  $(\Delta)$  ثم

نحصل على النقطة B نقطة تقاطع  $(D'_1)$

و  $(D_2)$  ومن ثم نشئ العمودي على  $(\Delta)$  و المار

من B ، هذا المستقيم الأخير يقطع  $(D_1)$  في A.




(2) - لدينا  $\vec{AM} = k \vec{AB}$  و  $\vec{CN} = k \vec{CD}$   
 إذن  $\vec{AM} = k \vec{AB}$  و  $\vec{NC} = k \vec{DC}$   
 وبما أن ABCD متوازي الأضلاع فإن  $\vec{AB} = \vec{DC}$   
 وبالتالي :  $\vec{AM} = \vec{NC}$   
 إذن الرباعي AMCN متوازي الأضلاع ومنه  
 للقطعتين [AC] و [NM] نفس المنتصف O.  
 إذن O منتصف القطعة [MN] أي أن :  
 $S_O(M) = N$

### تمرين 8 :

ABC مثلثا و O منتصف القطعة [BC].  
 H المسقط العمودي للنقطة B على المستقيم  
 (AO) و K المسقط العمودي للنقطة C على  
 المستقيم (AO).

- (1) - أنشئ الشكل.
- (2) - بين أن الرباعي BHCK متوازي الأضلاع.



### الجواب :

(1)

إذن صورة المستقيم (CM) بـ  $S_I$  هو المستقيم  
 المار من A والموازي لـ (CM)  
 أي أن  $S_I((CM)) = (\Delta)$   
 ب - لدينا :  $(CM) \cap (CA) = \{C\}$   
 و (EM) و (Δ) صورتي (CA) و (CM) على  
 التوالي بـ  $S_I$ .

إذن صورة C بـ  $S_I$  هي نقطة تقاطع (Δ)  
 و (EM) أي أن :  $S_I(C) = E$   
 (3) - بنفس الطريقة نبين أن :

$S_I((BM)) = (\Delta)$  و  $S_I(AB) = (MD)$   
 ولدينا  $(BM) \cap (AB) = \{B\}$

إذن صورة B بـ  $S_I$  هي نقطة تقاطع المستقيمين  
 (MD) و (Δ) أي أن :  $S_I(B) = D$   
 لدينا  $S_I(C) = E$  إذن  $S_I(E) = C$   
 ولدينا  $S_I(B) = D$   
 إذن  $S_I((BE)) = (CD)$

وبالتالي :  $(BE) \parallel (CD)$

### تمرين 7 :

ABCD متوازي الأضلاع مركزه O.

M و N نقطتان على (AB) و (CD) بحيث :

$$\vec{AM} = k \vec{AB} \text{ و } \vec{CN} = k \vec{CD}$$


(1) - أنشئ الشكل.

(2) - بين أن :  $S_O(M) = N$

### الجواب :

(1)

### الجواب :



\* نشئ (D') صورة (D) بالشمائل  $S_A$ .


أي أن :  $S_A((D)) = (D')$

(D') يقطع (Δ) في نقطة C و (AC) يقطع المستقيم (D) في النقطة B. وهكذا نحصل على النقطتين B و C حيث A منتصف القطعة [BC].

### تمرين 10 :

A و B نقطتين مختلفتين و I منتصف القطعة [AB] نعتبر الشمائل المركزية  $S_A$  و  $S_B$  و  $S_I$  التي مراكزها A و B و I على التوالي. أثبت أن :  $S_B \circ S_I \circ S_A = S_A$ .

### الجواب :



لتكن M نقطة من المستوى (P).

$M_1$  صورة M بالشمائل  $S_A$  و  $M_2$  صورة  $M_1$

بـ  $S_I$  و  $M'$  صورة  $M_2$  بـ  $S_B$ .

(2) - نعتبر الشمائل المركزي  $S_O$

O منتصف [BC] إذن  $S_O(B) = C$

لدينا  $(BH) \perp (OA)$  و  $(CK) \perp (OA)$

إذن  $(BH) \parallel (CK)$

وبما أن  $S_O(B) = C$  فإن صورة المستقيم

(BH) بالشمائل المركزي  $S_O$  هو المستقيم المار

من C والموازي لـ (BH) أي أن :

$$S_O((BH)) = (CK)$$

ولدينا :  $S_O(OA) = (OA)$  وبما أن :

$$(BH) \cap (OA) = \{H\}$$


$$\text{و } (OA) \cap (CK) = \{K\}$$

فإن  $S_O(H) = K$  إذن O منتصف (HK)

وبالتالي الرباعي BHCK متوازي الأضلاع.

### تمرين 9 :


نعتبر الشكل التالي :



أنشئ نقطة B تنتمي إلى المستقيم (D) ونقطة

C تنتمي إلى المستقيم (Δ) حيث تكون النقطة A

منتصف القطعة [BC].




صور المثلث ABC بالإزاحة  $t_{AB}$  هي المثلث  $.BB'C'$

لدينا  $t_{BC}(B) = C$

$\overrightarrow{AA''} = \overrightarrow{BC}$  يعني  $t_{BC}(A) = A''$


$\overrightarrow{CC''} = \overrightarrow{BC}$  يعني  $t_{BC}(C) = C''$



لدينا  $t_{BC}(C) = A$

$\overrightarrow{AA'''} = \overrightarrow{CA}$  يعني  $t_{CA}(A) = A'''$

$\overrightarrow{BB'''} = \overrightarrow{CA}$  يعني  $t_{CA}(B) = B'''$



أي  $S_I(M_1) = M_2$  و  $S_A(M) = M_1$

و  $S_B(M_2) = M'$

إذن  $S_B \circ S_I \circ S_A(M) = M'$

لدينا  $S_A(M) = M_1$  إذن  $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AM_1}$  (1)

لدينا  $S_B(M_2) = M'$  إذن  $\overrightarrow{M_2B} = \overrightarrow{BM'}$  (2)

كذلك  $S_A(M_1) = M_2$  يعني أن I منتصف

$[M_1M_2]$  ولدينا I منتصف  $[AB]$ .

إذن قطرا الرباعي  $AM_1BM_2$  لهما نفس

المنتصف I ومنه  $AM_1BM_2$  متوازي الأضلاع

وبالتالي  $\overrightarrow{AM_1} = \overrightarrow{M_2B}$  (3) من العلاقات (1)

و (2) و (3) فإن  $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BM'}$

أي  $MAM'B$  أن متوازي الأضلاع وبالتالي

فإن قطراه لهما نفس المنتصف وحيث I منتصف

$[AB]$  فإن I منتصف  $[MM']$  وهذا يعني أن

$S_I(M) = M'$  وحيث أن

$M \in (P)$  لكل  $S_B \circ S_I \circ S_A(M) = M'$

فإن  $S_B \circ S_I \circ S_A = S_I$

### تمرين 11:

ABC مثلث أنشئ صور هذا المثلث بالإزاحات

$t_{AB}$  و  $t_{BC}$  و  $t_{CA}$ .

### الجواب:

لدينا  $t_{AB}(A) = B$

$BB' = \overrightarrow{AB}$  يعني  $t_{AB}(B) = B'$

$CC' = \overrightarrow{AB}$  يعني  $t_{AB}(C) = C'$




(1) - بين أن M صورة النقطة A بالإزاحة  $\vec{BC}$   
(2) - أ - أنشئ الشكل.

ب - أنشئ النقطة M' صورة النقطة B بالإزاحة  $t_{\vec{AC}}$  وبين أن C منتصف [MM'] .

### الجواب :

(1) - لدينا  $\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0}$   
أي أن :  $\vec{MA} + \vec{BM} + \vec{MC} = \vec{0}$   
إذن  $\vec{AM} = \vec{BC}$  ومنه  $\vec{MA} + \vec{BC} = \vec{0}$   
أي أن :  $t_{\vec{BC}}(A) = M$   
(2) - أ - لدينا  $\vec{AM} = \vec{BC}$   
إذن الرباعي BCMA متوازي الأضلاع.



ب - لدينا  $t_{\vec{BC}}(A) = M'$   
أي أن  $\vec{AC} = \vec{BM}'$

إذن الرباعي ACM'B متوازي الأضلاع.  
ب - لدينا BCMA متوازي الأضلاع إذن :

$$(1) \vec{MC} = \vec{AB}$$

لدينا ACM'B متوازي الأضلاع إذن :


$$(2) \vec{CM}' = \vec{AB}$$

من (1) و (2) نستنتج أن  $\vec{MC} = \vec{CM}'$   
إذن C منتصف القطعة [MM'] .

### تمرين 12 :

ABC مثلثا و D مائلة A بالنسبة للنقطة B و E صورة النقطة B بالإزاحة  $t_{\vec{AB}}$ .  
(1) - أنشئ الشكل.  
(2) - بين أن المثلث ABC هو صورة المثلث BDE بإزاحة T يتم تحديد متجهتها.

### الجواب :



(1) - لدينا  $t_{\vec{AB}}(B) = E$  إذن  $\vec{AC} = \vec{BE}$  ومنه الرباعي ACEB متوازي الأضلاع.  
(2) - لدينا D مائلة A بالنسبة لـ B إذن  $\vec{BD} = \vec{AB}$  لدينا  $t_{\vec{AB}}(B) = E$  إذن الرباعي ACE متوازي الأضلاع ومنه :  $\vec{CE} = \vec{AB}$

إذن  $t_{\vec{AB}}(C) = E$  و  $t_{\vec{AB}}(B) = D$

وبما أن  $t_{\vec{AB}}(A) = B$

فإن صورة المثلث ABC بالإزاحة  $t_{\vec{AB}}$  هو المثلث BDE. ومنه ABC صورة للمثلث BDE

بالإزاحة  $T = t_{\vec{BA}}$  إذن  $t_{\vec{BA}}(B) = A$

### تمرين 13 :

A و B و C ثلاث نقط من المستوى (P).  
M نقطة تحقق العلاقة :  $\vec{MA} - \vec{MB} + \vec{MC} = \vec{0}$



### تمرين 14:

لتكن A و B نقطتين مختلفتين من المستوى (P).  
نربط كل نقطة M من المستوى بالنقطة M' بحيث :

$$2\vec{MA} + 3\vec{AB} = 2\vec{M'A} = \vec{0}$$

بين أن التطبيق f الذي يحول كل نقطة M بالنقطة M' هو إزاحة حدد متجهتها.

### الجواب:

f(M) = M' يعني

$$2\vec{MA} + 3\vec{AB} = 2\vec{M'A} = \vec{0}$$

$$2\vec{MA} + 2\vec{AM'} + 3\vec{AB} = \vec{0} \text{ يعني}$$

$$2\vec{MM'} = -3\vec{AB} \text{ يعني}$$

$$\vec{MM'} = -\frac{3}{2}\vec{AB} \text{ يعني}$$

إذن f إزاحة متجهتها  $\frac{3}{2}\vec{AB}$

$$f = t_{\frac{3}{2}\vec{AB}} \text{ أي}$$


### تمرين 15:

لتكن (D) و (D') مستقيمين متوازيين. نعتبر نقطة A من (D) و A' نقطة من (D') يكون المستقيم (AA') عمودي على المستقيم

(D). ليكن  $S_{(D)}$  التمثال المحوري الذي محوره (D).  $S_{(D')}$  و هو التمثال المحوري الذي محوره (D')

$$S_{(D')} \circ S_{(D)} = t_{2\vec{AA'}} \text{ (D') أثبت أن :}$$

### الجواب:



لتكن  $M \in (P)$

M' صورة M بالتمثال المحوري  $S_{(D)}$

$$S_{(D)}(M) = M' \text{ أي}$$

M'' صورة M' بالتمثال المحوري  $S_{(D')}$

$$S_{(D')}(M') = M'' \text{ أي}$$

$$S_{(D')} \circ S_{(D)}(M) = M'' \text{ إذن}$$

$$\vec{MM''} = \vec{MI} + \vec{II'} + \vec{I'M''} \text{ لدينا}$$

$$= \vec{IM'} + \vec{II'} + \vec{M'I'}$$

$$= \vec{II'} + \vec{II'} = 2\vec{II'}$$

IAA'I' مستطيل إذن  $\vec{II'} = \vec{AA'}$

ومنه  $2\vec{AA'}$  أي  $\vec{MM''}$

$$t_{2\vec{AA'}}(M) = M''$$

وبالتالي  $S_{(D')} \circ S_{(D)} = t_{2\vec{AA'}}$

### تمرين 16:

(1) - لتكن  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتين بين أن :

$$t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$$

(2) - ماهي طبيعة الرباعي ABCD علما أن :

$$t_{\vec{BD}} \circ t_{\vec{AB}} = t_{\vec{BC}}$$

### الجواب:

(1) - لتكن M نقطة من المستوى.

M<sub>1</sub> صورة M بالإزاحة  $t_{\vec{v}}$  أي  $t_{\vec{v}}(M) = M_1$

M<sub>2</sub> صورة M<sub>1</sub> بالإزاحة  $t_{\vec{u}}$  أي

$$t_{\vec{u}}(M_1) = M_2$$

إذن  $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}(M) = M_2$  (1)

وهذا يعني أن  $t_{\vec{u}+\vec{v}}(M) = M_2$  (2)

من (1) و (2) نستنتج أن :

$$t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$$

(2) - لدينا  $t_{\vec{BD}} \circ t_{\vec{AB}} = t_{\vec{BC}}$



### تمرين 18


A و B نقطتان.

(1) - (D) مستقيم معلوم و M نقطة تتغير عليه ماهي مجموعة النقط M' بحيث يكون الرباعي MABM' متوازي الأضلاع؟

(2) - (E) دائرة معلومة و M نقطة تتغير عليها.

ماهي مجموعة النقط M' حيث MABM' متوازي الأضلاع؟

### الجواب :



لدينا MABM' متوازي الأضلاع

إذن  $\vec{MM}' = \vec{BC}$  أي أن  $M' = t_{\vec{AB}}(M)$

إذن M' صورة M بالإزاحة  $t_{\vec{AB}}$

وبما أن M تتغير على المستقيم (D) فإن M'

تتغير على المستقيم (D') صورة (D) بالإزاحة  $t_{\vec{AB}}$ .

إذن مجموعة النقط M' هي المستقيم (D') المار

من M' والموازي لـ (D)

(2) - لدينا MABM' متوازي الأضلاع

إذن  $\vec{MM}' = \vec{AB}$

أي أن  $M' = t_{\vec{AB}}(M)$

$$\vec{t}_{\vec{BD}} + \vec{AB} = \vec{t}_{\vec{BC}} \text{ يعني}$$

$$\vec{BD} + \vec{AB} = \vec{BC} \text{ يعني}$$

$$\vec{AD} = \vec{BC} \text{ يعني}$$


وهذا يعني أن ABCD متوازي الأضلاع.

### تمرين 17

نعتبر الثمائلين المركزين  $S_B$  و  $S_A$ .

أثبت  $S_A \circ S_B$  هو الإزاحة ذات المتجهة  $-2\vec{AB}$ .

### الجواب :



لتكن  $M \in (P)$

ولتكن  $M_1$  صورة M بـ  $S_B$

أي  $S_B(M) = M_1$

$M_2$  صورة  $M_1$  بـ  $S_A$

أي  $S_A(M_1) = M_2$

ومنه  $S_A \circ S_B(M) = M_2$

$$\vec{MM}_2 = \vec{MB} + \vec{BA} + \vec{AM}_2$$

$$= \vec{BM}_1 + \vec{BA} + \vec{M}_1A$$

$$= \vec{BA} + \vec{BA}$$

$$= 2\vec{BA}$$

ومنه  $\vec{MM}_2 = -2\vec{BA}$

وهذا يعني  $t_{-2\vec{AB}}(M) = M_2$

وبالتالي :  $S_A \circ S_B = t_{-2\vec{AB}}$

$$(2) \quad \vec{N'A} - \vec{N'B} + 5\vec{NN'} = \vec{0}$$

من (1) - (2) نستنتج أن

$$\vec{M'A} - \vec{M'B} + 5\vec{MM'} = \vec{N'A} + \vec{N'B} - 5\vec{NM'} = \vec{0}$$

$$\vec{BA} + 5\vec{MM'} + \vec{BA} - 5\vec{NN'} = \vec{0} \quad \text{يعني}$$

$$5\vec{MN} + 5\vec{NM'} - 5\vec{NM'} - 5\vec{M'N'} = \vec{0} \quad \text{يعني}$$

$$5\vec{MN} - 5\vec{M'N'} \quad \text{يعني}$$

$$\vec{M'N'} = \vec{MN} \quad \text{يعني}$$

إذن f إزاحة

$$\text{يعني } f(M) = M' - (2)$$

$$\vec{M'A} - \vec{M'B} + 5\vec{MM'} = \vec{0}$$

$$\vec{BA} + 5\vec{MM'} = \vec{0} \quad \text{يعني}$$

$$\vec{MM'} = \frac{1}{5} \vec{AB} \quad \text{يعني}$$

$$t_{\perp \vec{AB}}(M) = M' \quad \text{يعني}$$

ومنه  $f = t_{\perp \vec{AB}}$  أي f إزاحة متجهتها  $\vec{u} = \frac{1}{5} \vec{AB}$

### تمرين 20:


لتكن  $(\mathcal{E})$  و  $(\mathcal{E}')$  دائرتين متقايسيتين ومتقاطعتين في نقطتين A و B النقطتان E و F متقابلتان قطريا

لنقطة A على كل من الدائرتين  $(\mathcal{E})$  و  $(\mathcal{E}')$ .

1 - أثبت أن النقط B، E و F مستقيمية.

2 - بين أن B منتصف [EF].

### الجواب:




إذن صورة M صورة M بالإزاحة  $t_{\perp \vec{AB}}$  بما أن M تتغير

على الدائرة  $(\mathcal{E})$  فإن M تتغير على الدائرة

$(\mathcal{E}')$  صورة  $(\mathcal{E})$  بالإزاحة  $t_{\perp \vec{AB}}$  إذن مجموعة

النقط M هي الدائرة  $(\mathcal{E}')$  صورة  $(\mathcal{E})$

بالإزاحة  $t_{\perp \vec{AB}}$ .



### تمرين 19:

نعتبر نقطتين مختلفتين A و B من المستوى (P).

لتكن F التطبيق الذي يربط كل نقطة M

بالنقطة M' بحيث :

$$\vec{M'A} - \vec{M'B} + 5\vec{MM'} = \vec{0}$$

1 - باستعمال الخاصية المميزة بين أن f إزاحة.

2 - حدد متجهة الإزاحة f.

### الجواب:

(1) - لتكن M و N نقطتين من (P) و M'

و N' صورتيهما بـ f

يعني  $f(M) = M'$

$$(1) \quad \vec{M'A} - \vec{M'B} + 5\vec{MM'} = \vec{0}$$

يعني  $f(N) = N'$

يعني  $t(B) \in (\mathcal{E}) \cap (EF)$

يعني  $t(B) \in \{B, F\}$

وحيث أن الإزاحة  $t$  لا تقبل نقطة صامدة

لأن  $t(B) = F$  فإن  $\vec{OO}' \neq \vec{0}$

أي  $\vec{BF} = \vec{OO}'$

إذن  $\begin{cases} \vec{BF} = \vec{OO}' \\ \vec{EB} = \vec{OO}' \end{cases}$  ومنه  $\vec{EB} = \vec{BF}$

وبالتالي فإن  $B$  منتصف  $[EF]$ .

ملاحظة : يمكن البرهان دون استعمال الإزاحة وذلك بالبرهان على أن  $B$  هي المسقط العمودي لـ  $A$  في المثلث  $AEF$  المتساوي الساقين ومنه تكون  $B$  منتصف  $[EF]$ .

### تمرين 21:


لتكن  $ABCD$  رباعيا.

أنشئ صور النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  و  $D$

- بالتحاكي الذي مركزه  $A$  ونسبته  $\frac{2}{3}$ .

- بالتحاكي الذي مركزه  $B$  ونسبته  $\frac{1}{3}$ .

### الجواب :



(1) - لدينا  $[AE]$  قطر في الدائرة  $(\mathcal{E})$  و  $B \in (\mathcal{E})$  إذن  $\widehat{EBA} = \frac{\pi}{2}$

كذلك  $[AF]$  قطر في الدائرة  $(\mathcal{E}')$  و  $B \in (\mathcal{E}')$  إذن  $\widehat{ABF} = \frac{\pi}{2}$  ومنه

$\widehat{EBF} = \widehat{EBA} + \widehat{ABF} - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$  وبالتالي  $E, B, F$  نقط مستقيمة.

(2) - نعتبر المثلث  $AEF$  و  $O$  منتصف  $[AE]$

و  $O'$  منتصف  $[AF]$  إذن  $2\vec{OO}' = \vec{EF}$

إذن  $EF = 2OO'$  ومنه  $EF > OO'$

نعتبر الإزاحة  $t$  التي متجهتها  $\vec{OO}'$

لدينا  $t(O) = O'$  لأن  $\vec{OO}' = \vec{OO}'$  و  $t(O) \in (\mathcal{E})$  و  $(\mathcal{E}')$  لهما نفس الشعاع إذن :

$$t((\mathcal{E})) = (\mathcal{E}')$$

ولدينا  $E \in (\mathcal{E}) \cap (EF)$  إذن

$$t(E) \in t((\mathcal{E})) \cap t((EF))$$

يعني  $t(E) \in (\mathcal{E}') \cap (EF)$

ملاحظة :  $t((EF)) = (EF)$  لأن متجهة الإزاحة  $t$  .  $\vec{OO}'$  ورجحة لـ  $(EF)$

إذن :  $t(E) \in \{B, F\}$

لأن  $(\mathcal{E}') \cap (EF) = \{B, F\}$

ومنه  $t(E) = B$  أو  $t(E) = F$

وبما أن  $EF > OO'$  فإن  $t(E) = B$

$$\vec{EB} = \vec{OO}'$$

كذلك :  $B \in (\mathcal{E}) \cap (EF)$

إذن  $t(B) \in t((\mathcal{E})) \cap t((EF))$

$$\vec{CA} = -\frac{2}{3} \vec{BA} \quad - (2)$$

$$\vec{AC} = -\frac{2}{3} \vec{AB} \quad \text{يعني}$$

$$h = h\left(A, +\frac{2}{3}\right) \quad \text{حيث } h(B) = C$$

$$k = -\frac{2}{3} \quad \text{وبالتالي}$$

$$\vec{AC} = \frac{3}{2} \vec{AB} \quad \text{يعني } 3\vec{AB} = 2\vec{AC} \quad - (3)$$

$$h = h\left(A, \frac{2}{3}\right) \quad \text{حيث } h(B) = C$$

$$k = \frac{3}{2} \quad \text{وبالتالي}$$

$$\vec{CA} = -3 \vec{AB} \quad \text{لدينا } - (4)$$

$$\vec{AC} = 3 \vec{AB} \quad \text{يعني}$$

$$h = h(A, 3) \quad \text{حيث } h(B) = C$$

$$k = 3 \quad \text{وبالتالي}$$

### تمرين 23:


ABCD شبه منحرف حيث :

$$CD = 5 \quad \text{و } AB = 3 \quad \text{و } (AB) \parallel (CD)$$

(1) - حدد مركز ونسبة التحاكي  $h$  الذي يحول  
A إلى D و يحول B إلى C.

(2) - حدد مركز ونسبته التحاكي  $h'$  الذي يحول  
A إلى C و يحول B إلى D.

### الجواب:



نعتبر التحاكي  $h$  بحيث :  $h = h\left(A, \frac{2}{3}\right)$

$h(A) = A$  لأن A مركز التحاكي  $h$ .

$$\vec{AB}' = \frac{2}{3} \vec{AB} \quad \text{يعني } h(B) = B'$$

$$\vec{AC}' = \frac{2}{3} \vec{AC} \quad \text{يعني } h(C) = C'$$

$$\vec{AD}' = \frac{2}{3} \vec{AD} \quad \text{يعني } h(D) = D'$$

نعتبر التحاكي  $h$  الذي مركزه B ونسبته  $-\frac{1}{3}$ .

$h(B) = B$  لأن B هو مركز التحاكي

$$\vec{BA}'' = -\frac{1}{3} \vec{BA} \quad \text{يعني } h(A) = A''$$

$$\vec{BC}'' = -\frac{1}{3} \vec{BC} \quad \text{يعني } h(C) = C''$$

$$\vec{BD}'' = -\frac{1}{3} \vec{BD} \quad \text{يعني } h(D) = D''$$

### تمرين 22:

حدد في الحالات التالية نسبة التحاكي الذي  
مركزه A ويحول النقطة B إلى النقطة C في كل  
حالة :

$$3\vec{AC} + 2\vec{AB} = \vec{0} \quad - (1)$$

$$\vec{CA} = -\frac{2}{3} \vec{AB} \quad - (2)$$

$$3\vec{AB} = 2\vec{AC} \quad - (3)$$

$$\vec{CA} = -3 \vec{AB} \quad - (4)$$

### الجواب:

ليكن  $h$  تحاكي مركزه A ونسبته  $k$  ويحول B إلى  
C.

$$3\vec{AC} + 2\vec{AB} = \vec{0} \quad - (1)$$

$$\vec{AC} = -\frac{2}{3} \vec{AB} \quad \text{يعني}$$

$$h = h\left(A, -\frac{2}{3}\right) \quad \text{حيث } h(B) = C$$

$$\text{وبالتالي } k = -\frac{2}{3}$$

إذن  $h'(J, -\frac{5}{3})$

### تمرين 24:

لتكن A و B نقطتين ثابتتين من (P) نعتبر التطبيق f الذي يربط كل نقطة M بالنقطة M'

$$\vec{MM}' = 3\vec{MA} + 3\vec{MB} \text{ بحيث}$$

أثبت أن f تحاك مركزه I منتصف [AB] وحدد نسبته.

### الجواب:

$$\vec{MM}' = 3\vec{MA} + 3\vec{MB} \text{ يعني } f(M) = M'$$

يعني

$$\vec{MM}' = 3\vec{MI} + 3\vec{IA} + 3\vec{MI} + 3\vec{IB}$$

$$\vec{MI} + \vec{IM}' = 6\vec{MI} \text{ يعني}$$

$$\vec{IM}' = 6\vec{MI} - \vec{MI} \text{ يعني}$$

$$\vec{IM}' = -5\vec{MI} \text{ يعني}$$

إذن f هو التحاكي الذي نسبته  $k = -5$  ومركزه I منتصف [AB].

### تمرين 25:

لتكن ABCD متوازي الأضلاع و I نقطة


معلومة تنتمي إلى [BD].

لتكن h التحاكي الذي مركزه I و يحول B إلى D.

1 - حدد h(A) و h(J)

2 - أثبت أن  $IA^2 = IJ \times IK$ .

### الجواب:



(1) - نعتبر  $h(I, k)$

لدينا  $h(A) = D$  و  $h(B) = C$

$$\vec{ID} = k\vec{IA} \text{ و } \vec{IC} = k\vec{IB}$$

إذن النقط I و A و D مستقيمات والنقط I و B و C

و C مستقيمة وبالتالي  $I \in (BC)$

و  $I \in (AD)$

إذن I هي نقطة تقاطع (BC) و (AD)

لدينا حسب خاصية طاليس المباشرة في

المثلث IDC :

$$\frac{ID}{IA} = \frac{IC}{IB} = \frac{DC}{AB} = \frac{5}{3}$$

وبما أن  $\vec{ID} = k\vec{IA}$  فإن

$$\frac{ID}{IA} = |k|$$

إذن  $|k| = \frac{5}{3}$  وبما أن  $\vec{ID}$  و  $\vec{IA}$  لهما نفس

المنحى فإن  $k = \frac{5}{3}$

إذن  $h(I, \frac{5}{3})$

(2) - نعتبر  $h'(J, k')$

لدينا  $h(A) = C$  و  $h(B) = D$

إذن J هي نقطة تقاطع المستقيمين (AC)

و (BD)

حسب خاصية طاليس المباشرة

$$\frac{JD}{JA} = \frac{JC}{JB} = \frac{DC}{AB} = \frac{5}{3} \text{ لدينا}$$

لدينا  $h(B) = D$  إذن  $\vec{JD} = k'\vec{JB}$

$$\frac{JD}{JA} = |k'| \text{ إذن}$$

$$|k'| = \frac{5}{3} \text{ أي أن}$$


وبما أن  $\vec{JD}$  و  $\vec{JB}$  لهما منحيين متعاكسين

$$\text{فإن } k' = -\frac{5}{3}$$

### تمرين 26:

لتكن  $ABC$  مثلث نربط كل نقطة  $M$  من القطعة  
 $[BC]$  بنقطة  $M'$  حيث  $M$  منتصف  $[AM']$ .  
 1 - بين أنه يوجد تحاك  $h$  حيث  $h(M) = M'$   
 لكل  $M$  من القطعة  $[BC]$ .  
 2 - استنتج مجموعة النقط  $M'$  عندما تتغير  $M$   
 على  $[BC]$ .

### الجواب:



1 - لدينا  $M$  منتصف  $[AM']$   
 ومنه  $\vec{AM'} = 2\vec{AM}$   
 أي أن  $M'$  صورة  $M$  بالتحاكي  $h$  الذي مركزه  
 $A$  ونسبته 2.  
 2 - إذا كانت  $M$  تتغير على القطعة  $[BC]$  فإن  
 $M'$  تتغير على صورة القطعة  $[BC]$  بالتحاكي  
 $h(A, 2)$  أي أن  $M'$  تتغير على القطعة  $[B'C']$   
 حيث:  $\vec{AB'} = 2\vec{AB}$  و  $\vec{AC'} = 2\vec{AC}$   
 أي أن  $B$  منتصف  $[AB']$  و  $C$  منتصف  $[AC']$   
 إذن مجموعة النقط  $M'$  عندما تتغير  $M$  على  
 القطعة  $[BC]$  هي القطعة  $[B'C']$ .

لدينا  $h(B) = D$

إذن صورة المستقيم  $(AB)$  هي المستقيم المار من

$D$  والموازي لـ  $(AB)$  أي  $(DC)$

ولدينا  $I \in (AI)$  إذن  $h((AI)) = (AI)$

لدينا  $A \in (AI) \cap (AB)$

إذن  $h(A) \in h((AI)) \cap h((AB))$

يعني  $h(A) \in h(AI) \cap (DC)$

ولدينا  $(AI) \cap (DC) = \{k\}$  وبالتالي

$h(A) = k$  لدينا  $h((AI)) = (AI)$

لأن  $h \in (AI)$

لدينا  $h(B) = D$  إذن صورة  $(BC)$  هي المستقيم

المار من  $D$  والموازي لـ  $(BC)$  أي المستقيم

$(AD)$ .

إذن  $h((BC)) = (AD)$

لدينا  $J \in (BC) \cap (AD)$

إذن  $h(J) \in h((BC) \cap (AD))$

يعني  $h(J) \in (AD) \cap (AI)$

لدينا  $\{A\} = (AD) \cap (AI)$  ومنه  $h(J) = A$

(2) - لدينا  $h(A) = k$  يعني  $\vec{IA} = k\vec{IJ} - k\vec{IA}$  حيث

$k$  نسبة التحاكي  $h$ .

يعني  $h(J) = A$  يعني  $\vec{IA} = k\vec{IJ}$

ومنه  $IA = |k| IJ$  و  $Ik = |k| IA$

إذن  $\frac{IA}{IJ} = \frac{Ik}{IA}$  وبالتالي  $IA^2 = IJ \times IK$

## تمرين 27:

ABCD متوازي الأضلاع I و J

بحيث  $\vec{IJ} = \vec{DC}$  و  $\vec{CI} = \frac{2}{3} \vec{CB}$  1 - أنشئ الشكل.

2 - بين أن المستقيم (BJ) هو صورة المستقيم (AI) بالإزاحة ذات المتجهة  $\vec{AB}$ .

3 - ليكن h التحاكي الذي مركزه I بحيث  $h(B) = C$

أ - بين أن المستقيم (CD) هو صورة (AB) بالتحاكي h.


ب - بين أن نسبة التحاكي h هي  $k = -2$ .

ج - بين أن  $\vec{kI} = 2 \vec{AB}$

و  $\vec{AI} = -\frac{1}{2} \vec{Ck}$  حيث k هي صورة J بالتحاكي h.

## الجواب:

(1)



(2) - لتكن t الإزاحة التي متجهتها  $\vec{AB}$  لدينا  $t(A) = B$  ولدينا  $\vec{AB} = \vec{IJ}$  إذن ABJI

متوازي الأضلاع ومنه (BJ) // (AI)

وحيث أن صورة المستقيم (AI) بالإزاحة t هي

مستقيم يوازيه ويمر من B أي (BJ)

ومنه  $t((AI)) = (BJ)$

(3) - أ - لدينا  $h(B) = C$  ونعلم أن صورة

المستقيم (AB) بالتحاكي h هي مستقيم يمر من

C ويوازي (AB) أي (DC)

ومنه  $h((AB)) = (CD)$

ب - لدينا  $\vec{CI} = \frac{2}{3} \vec{CB}$

يعني  $\vec{CI} = \frac{2}{3} \vec{CI} + \frac{2}{3} \vec{IB}$

يعني  $\vec{CI} - \frac{2}{3} \vec{CI} = \frac{2}{3} \vec{IB}$

يعني  $\frac{1}{3} \vec{CI} = \frac{2}{3} \vec{IB}$

يعني  $\vec{CI} = 2 \vec{IB}$

يعني  $\vec{IC} = -2 \vec{IB}$

إذن التحاكي الذي مركزه I ويحول B إلى C

نسبته  $k = -2$

ج - لدينا  $h(J) = k$

يعني  $\vec{Ik} = -2 \vec{IJ}$

يعني  $\vec{Ik} = -2 \vec{DC}$

يعني  $\vec{Ik} = -2 \vec{AB}$

يعني  $\vec{kI} = 2 \vec{AB}$

لدينا  $h(B) = C$  و  $h(J) = k$  إذن حسب الخاصية المميزة للتحاكي

فإن  $\vec{Ck} = -2 \vec{BJ}$

يعني  $\vec{BJ} = -\frac{1}{2} \vec{Ck}$

ونعلم أن  $\vec{BJ} = \vec{AI}$

إذن  $\vec{AI} = -\frac{1}{2} \vec{Ck}$

## تمرين 28:

ليكن ABC مثلثا و E النقطة التي تحقق:

$$\vec{CE} = -\frac{1}{3} \vec{AB}$$



2 - لدينا  $I \in (CI)$  إذن  $h((CI)) = (CI)$  و  $h(B) = E$  إذن صورة المستقيم  $(BC)$  بـ  $h$  هي مستقيم المار من  $E$  والموازي لـ  $(BC)$  أي

المستقيم  $(EJ)$  لدينا  $C \in (CB) \cap (CI)$

إذن  $h(C) \in h((CB)) \cap h((CI))$

أي  $h(C) \in (EJ) \cap (CI) = \{J\}$

وبالتالي  $h(C) = J$

### تمرين 29

أ و B و C ثلاث نقط حيث B منتصف القطعة  $[AC]$ .  $(\Delta)$  مستقيم مار من القطعة A ويخالف

$(AB)$  وغير عمودي على  $(AB)$ .  $B'$  و  $C'$  هما

المسقطان العموديان على التوالي للنقطتين B

و C على  $(\Delta)$ . I نقطة تقاطع المستقيمين  $(BC')$  و

$(B'C)$  وليكن  $h$  التحاكي الذي مركزه I ويجول

B إلى  $C'$ .

(1) - حدد  $h(B')$  واحسب k نسبة التحاكي

$h$ .

(2) - أ - حدد العدد الحقيقي  $\alpha$

حيث  $\vec{BI} = \alpha \vec{BC}'$ .

ب - حدد مجموعة النقط (E) للنقطة  $C'$  عندما


تتغير على  $(\Delta)$ .

ج - حدد مجموعة النقط (F) للنقطة I عندما

يتغير  $(\Delta)$ .

(3) - أنشئ الشكل علما أن  $AB = 4 \text{ cm}$ .

النقطة I هي تقاطع  $(BE)$  و  $(CA)$  (أنظر الشكل) نعتبر التحاكي  $h$  الذي مركزه I ويجول النقطة A إلى النقطة C.



1 - أ - حدد صورة النقطة B بالتحاكي  $h$ .

ب - استنتج نسبة التحاكي  $h$ .

2 - المستقيم المار من النقطة E والموازي للمستقيم

$(BC)$  يقطع المستقيم  $(AI)$  في النقطة J. بين أن

صورة النقطة C بالتحاكي  $h$  هي النقطة J.

### الجواب

(1) - أ - لدينا مركز التحاكي  $h$  هو النقطة I

لدينا  $I \in (BI)$  ومنه  $h((BI)) = (BI)$

لدينا  $h(A) = C$  إذن صورة المستقيم  $(AB)$

هي مستقيم يمر من C ويوازي  $(AB)$  أي

$(EC)$  ومنه  $h((AB)) = (EC)$

لدينا  $B \in (BI) \cap (AB)$

إذن  $h(B) \in h((BI)) \cap h((AB))$

أي  $h(B) \in (BI) \cap (EC)$

وبما أن  $h(B) = E$  فإن  $(BI) \cap (EC) = \{E\}$

ب - لتكن k نسبة التحاكي  $h$

لدينا  $h(A) = C$  و  $h(B) = E$  إذن حسب

الخاصية المميزة للتحاكي  $h$  هي  $\vec{CE} = k \vec{AB}$

ولدينا  $\vec{CE} = \frac{1}{3} \vec{AB}$  إذن نسبة التحاكي

$h$  هي  $k = \frac{1}{3}$

أقطارها [AC].

النقطة  $C' \neq C$  و  $C' \neq A$

إذن مجموعة النقط  $C'$  هي الدائرة  $(\mathcal{E})$  محرومة من النقطتين A و C.

وبالتالي  $(E) = (\mathcal{E}) \setminus \{A, C\}$   
ج - لدينا  $\vec{IB} = \frac{1}{3} \vec{BC}'$

أي أن I صورة C' بالتحاكي  $h'(B, \frac{1}{3})$   
إذن عندما تتغير النقطة C' على الدائرة

$\{A, C\} \setminus (\mathcal{E})$  فإن النقطة I تتغير على الدائرة  
( $\mathcal{E}'$ ) صورة ( $\mathcal{E}$ ) بالتحاكي  $h'(B, \frac{1}{3})$  محرومة من النقطتين A' و B' حيث :


$h'(A) = A'$  و  $h'(C) = C'$

ولدينا شعاع الدائرة ( $\mathcal{E}'$ ) هو :

$$r' = \frac{1}{3} \times r$$

حيث r شعاع الدائرة ( $\mathcal{E}$ ) ومركز ( $\mathcal{E}'$ ) هو صورة مركز ( $\mathcal{E}$ ).

إذن  $F = (\mathcal{E}') \setminus \{A', C'\}$   
(3) - الإنشاء :



بما أن [AC] قطر لـ ( $\mathcal{E}$ ) فإن B مركزها.


مركز ( $\mathcal{E}'$ ) هو النقطة B'

حيث  $h'(B) = B'$

أي أن  $h'(B) = B'$  شعاع ( $\mathcal{E}'$ ) هو :

$$r' = \frac{1}{3} \times r = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$$

الجواب :



(1) - لدينا  $h(B) = C'$  إذن  $\vec{IC}' = k \vec{IB}$

حسب مبرهنة طاليس المباشرة

لدينا :  $\vec{IC}' = k \vec{IB}$

أي أن  $h(B') = C$

لدينا  $h(B) = C'$  و  $h(B') = C$

إذن حسب الخاصية المميزة للتحاكي فإن :

$$\vec{CC}' = k \vec{B'B}$$

إذن  $|k| = \frac{CC'}{B'B}$

نعتبر المثلث ACC'.

لدينا B منتصف [AC] و  $(BB') \parallel (CC')$

إذن B' منتصف [AC'] و  $CC' = 2 B'B$

$$\frac{CC'}{B'B} = 2$$

إذن  $|k| = 2$  وبما أن  $\vec{B'B}$  و  $\vec{CC}'$  لهما

منحنيان متعاكسان

فإن  $k = -2$

(2) - أ -

لدينا  $h(B) = C'$  إذن  $\vec{IC}' = k \vec{IB}$

ومنه  $\vec{IC}' = -2 \vec{IB}$

أي أن  $\vec{IB} + \vec{BC}' = -2 \vec{IB}$

إذن  $3 \vec{IB} = - \vec{BC}'$

ومنه  $\vec{IB} = \frac{1}{3} \vec{BC}'$

إذن  $\alpha = \frac{1}{3}$

ب - لدينا الزاوية قائمة  $\widehat{AC'C}$  قائمة و A و C

نقطتان ثابتان إذن عندما يتغير المستقيم ( $\Delta$ )

فإن النقطة C' تتغير على الدائرة ( $\mathcal{E}$ ) التي أحد