


و لدينا: $(JK) \subset (IJK)$ و $(IJ) \subset (IJK)$
إذن $(1) \wedge (2) \wedge (3) \wedge (4)$ نستنتج أن: $(BCD) \parallel (IJK)$

تمرين 3: ليكن $ABCD$ رباعي أوجه حيث: $BD = DC$ و لتكن I و J منتصف القطعة $[AC]$ و K منتصف القطعة $[AB]$ و J منتصف القطعة $[AC]$ و K منتصف



القطعة $[BC]$
أنشئ شكلًا مناسبًا.
(2) بين أن $(IJ) \perp (DK)$

الجواب 1:
في المثلث ABC لدينا I منتصف $[AC]$ و J منتصف $[AB]$ إذن
 $(1) (IJ) \parallel (BC)$
وفي المثلث BCD لدينا K منتصف $[BD] = DC$ و J منتصف

(2) $(DK) \perp (BC)$ إذن $(DK) \perp (IJ)$ من (1) و (2) نستنتج أن: $(DK) \perp (IJ)$

تمرين 4: ليكن $ABCD$ رباعي أوجه منحرف قطراه $[AC]$ و $[BD]$ يتقاطعان في I . لتكن S نقطة من الفضاء لا تنتمي إلى المستوى (ABC) بحيث يكون $(SI) \perp (ABC)$

1) حدد تقاطع المستويين (SAC) و (SBD) و (SAB) و (SCD) .

2) تتحقق أن $(AB) \perp (SI)$ و بين أن المستويين (SAC) و (ABC) متعامدان.

3) نفترض أن المثلث ABC قائم الزاوية في B و أن $SI = 3$

$$CD = 3, AB = 2, BC = \frac{1}{4}$$

أحسب حجم الهرم $SABCD$.

الجواب 1: لدينا $(SAC) \neq (SBD)$ لأن النقطة S

غير مستوائية.

لدينا: $S \in (SAC)$

و $S \in (SBD)$

ولدينا $I \in (AC)$

$I \in (SAC)$ إذن $(AC) \subset (SAC)$

ولدينا $I \in (BD)$ و $I \in (SBD)$ إذن

إذن المستويان (SAC) و (SBD) يشتركان في نقطتين S و I .

$$(SAC) \cap (SBD) = (IS)$$

ولدينا $S \in (SDC)$ و $S \in (SAB)$


ولدينا $(IS) \subset (SAB)$ إذن

إذن $(IS) \subset (SAB) \cap (SDC) = \{J\}$

تمرين 1:

ليكن $SABCD$ هرمًا قاعدته متوازي الأضلاع $ABCD$ و لتكن I و J منتصف القطعتين $[SB]$ و $[SC]$ على التوالي.

(1) بين أن $(AD) \parallel (IJ)$



(2) أثبت أن $(IJ) \parallel (ADS)$

الجواب 1:

في المثلث SBC لدينا: I منتصف $[SB]$ و J منتصف $[SC]$ إذن $(IJ) \parallel (BC)$.

و لدينا $ABCD$ متوازي أضلاع إذن $(AD) \parallel (BC)$ و منه أن $(IJ) \parallel (AD)$

لدينا $(AD) \subset (ADS)$ إذن $D \in (ADS)$ و $A \in (ADS)$ من (1) و (2) نستنتج أن: $(IJ) \parallel (ADS)$


تمرين 2:

ليكن $ABCD$ رباعي أوجه و لتكن I منتصف القطعة $[AC]$ و J منتصف القطعة $[AB]$ و K منتصف القطعة $[BC]$

أنشئ شكلًا مناسبًا.

(2) بين أن $(BCD) \parallel (IJK)$

الجواب 1:



(2) في المثلث ABC لدينا I منتصف $[AC]$ و J منتصف $[AB]$ إذن $(IJ) \parallel (BC)$

و لدينا في المثلث ABD : K منتصف $[AD]$ و J منتصف $[AB]$ إذن $(JK) \parallel (BD)$

ولدينا : $(IJ) \parallel (BC)$ و $(JK) \parallel (BD)$ إذن $(IJ) \parallel (BC) \parallel (JK) \parallel (BD)$


(1) $(IJ) \parallel (BC)$ و $(BC) \subset (BCD)$ إذن $(IJ) \parallel (BCD)$

(2) $(JK) \parallel (BD)$ و $(BD) \subset (BCD)$ إذن $(JK) \parallel (BCD)$

ولدينا : $(IJ) \cap (JK) = \{J\}$

- (2) بين أن $(CB') \parallel (AID)$
(3) حدد تقاطع المستويين (AID) و $(AB'C)$.

الجواب: 7



لدينا I منتصف القطعة $[BC]$ و B' مماثلة B بالنسبة للنقطة D .

إذن D منتصف $[BB']$

و منه $(ID) \subset (AID)$ ولدينا $(ID) \parallel (B'C)$

إذن $(CB') \parallel (AID)$

لدينا $(AID) \neq (AB'C)$ و $A \in (AID)$ و $A \in (AB'C)$

إذن المستويين (AID) و $(AB'C)$ يتقاطعان في مستقيم يمر من A .
و بما أن $(B'C) \subset (AB'C)$ و $(ID) \subset (AID)$

و أن $(B'C) \parallel (ID)$

فإن المستويين (AID) و $(AB'C)$ يتقاطعان في مستقيم يمر من A و يوازي (ID) و $(B'C)$.

تمرين 7: لين ABCDEFGH مكعباً.


لتكن I , J و K منتصفات القطع $[GH]$, $[EF]$, $[AB]$ على التوالي.

(1) بين أن النقط A , B , C , J , I , K و H مستوائية.

(2) بين أن النقط K , H , B , I , J و C مستوائية.

(3) بين أن $(IH) \parallel (KB)$

(4) استنتج أن $(IH) \parallel (JKC)$.



الجواب: 7

لدينا I منتصف $[BC]$ و J منتصف $[FG]$ و K منتصف $[AB]$ ولدينا $EJ \parallel HG$.

منتصف $[GH]$ إذن $(EH) \parallel (JK) \parallel (FG)$

و نعلم أن $(FG) \parallel (BC)$ إذن $(JK) \parallel (BC)$

و منه فإن النقط J , C , B , I , K و H مستوائية.

لدينا $(AB) \parallel (HG)$ و $(HG) \parallel (EF)$ إذن $(AB) \parallel (EF)$ و منه فإن

النقط A , B , G , H و I مستوائية.

ولدينا $K \in [HG]$ و $I \in [AB]$

إذن النقط I , H , B , J , K و C مستوائية.

لدينا $AB = HG$ (3) إذن $IB = HK$

و نعلم أن $(IB) \parallel (HK)$

إذن الرباعي $IBKH$ متوازي أضلاع و منه فإن $(IH) \parallel (KB)$.

ولدينا $(DC) \parallel (AB)$ و $(DC) \subset (SAB)$ إذن (SAB) و (DC) يتقاطعان في مستقيم يمر من S و يوازي المستقيمين (AB) و (DC) حسب مبرهنة السقف.

(2) لدينا $(AB) \subset (ABC)$ و $(SI) \perp (ABC)$ إذن $(SI) \perp (AB)$.

(3) لدينا $(SI) \perp (AC)$ و $(SI) \subset (SAC)$ إذن $(SAC) \perp (ABC)$ و منه فإن $(SI) \perp (ABC)$ و منه مساحة شبه المنحرف $ABCD$


$$S = \frac{(DC + AB) \times BC}{2} = \frac{(3+2) \times \frac{1}{4}}{2} = \frac{5}{8}$$

لأن ارتفاعه هو BC و منه حجم الهرم $SABCD$ هو:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S \times (SI) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{5}{8}\right) \cdot 3 = \frac{5}{8}$$

تمرين 5: لين $ABCDEFGH$ مكعباً في الفضاء.

لتكن I و J منتصفي القطعتين $[BC]$ و $[FG]$ على التوالي.



(1) بين أن $(IJ) \parallel (HFB)$

(2) بين أن $(HFB) \cap (EJ) = \{P\}$

حيث $\{P\} = (HF) \cap (EJ) = \{Q\}$

(3) بين أن $(PQ) \parallel (FB)$

الجواب: 7

لدينا I منتصف $[BC]$ و J منتصف $[FG]$ فان $(II) \parallel (HFB)$ و بما أن $(BF) \parallel (HFB)$ فان $(II) \parallel (BF)$ وهذا هو المطلوب.

لدينا $(EIJ) \subset (EIJ)$ و $(EJ) \subset (EIJ)$ (لأن $(IJ) \parallel (AI)$) و منه

النقط E , I , A و J نقاط استوانية.

إذن $(P \in (EJ) \wedge Q \in (AI)) \Rightarrow (Q \in (EIJ) \wedge P \in (EIJ))$ و هذا يعني أن

$(PQ) \subset (EIJ)$ (1) من جهة أخرى لدينا $(HF) \subset (HFB)$ (لأن $(PQ) \subset (EIJ)$) و منه النقط H , D , F و B مستوائية.

إذن $(Q \in (HFD) \wedge P \in (HFD))$ و هذا يعني أن

$(PQ) \subset (HFD)$ (2) بما أن $(EIJ) \neq (HFD)$ فان (1) و (2)

$(HFD) \cap (EIJ) = \{P\}$

(3) لدينا $(BF) \subset (HFD)$ (3) $(IJ) \subset (EIJ)$ و $(BF) \subset (EIJ)$ (لأن $(PQ) \parallel (FB)$)

و $(PQ) \parallel (FB)$ إذن $(HFD) \cap (EIJ) = \{P\}$

تمرين 6: لين $ABCD$ رباعي أوجه و لتكن I منتصف القطعة $[BC]$

و B' مماثلة B بالنسبة للنقطة D .

(1) أنشئ شكل مناسب.

تمرين 9: ليكن $ABCD$ مربعاً و E نقطة من الفضاء حيث:

$$(AE) \perp (ABC)$$

النقط I , J و K منتصفات القطع $[DC]$, $[EB]$, $[AB]$.

(1) بين أن $(IJ) \parallel (ADE)$.

بين أن $(IJK) \parallel (ADE)$.

(2) بين أن $(JK) \parallel (ABE)$.

(3) حدد تقاطع المستويين (AIK) و (ABE) .

الجواب: لدينا في المثلث ABE

J منتصف $[EB]$ و I منتصف $[AB]$.

$(IJ) \parallel (AE)$ إذن $(IJ) \parallel (ADE)$.

و لدينا $(AE) \subset (ADE)$ إذن $(IJ) \parallel (ADE)$ و منه المطلوب.

لدينا K منتصف $[DC]$ إذن $(JK) \parallel (AD) \parallel (BC)$.

(2) $(JK) \parallel (ADE)$ إذن $(AD) \subset (ADE)$.

إذن (1) و (2) نستنتج أن: $(JIK) \parallel (ADE)$ و منه المطلوب.

(2) لدينا $(AE) \perp (ABC)$ و $(AE) \perp (JK)$ إذن $(JK) \subset (ABC)$ و $(AD) \perp (AB)$ و $(JK) \parallel (AB)$ إذن $(JK) \parallel (AB)$ و منه فان (JK) عمودي على مستقيمين متتقاطعين هما (AB) و (AE) ضمن المستوى (ABE) إذن $(JK) \perp (ABE)$.

(3) لدينا $(E \notin (ABC))$ $(AIK) \neq (ABE)$ إذن $A \in (AIK)$ و $A \in (ABE)$ لدينا $I \in (EB)$ إذن $I \in (ABE)$ و $I \in (AIK)$ و منه $(AIK) \cap (ABE) = (AI)$.

(4) لدينا $(BB') \subset (BB'D)$ و $(AA') \subset (AA'C)$ و $(BB') \parallel (AA')$ و $(AA') \cap (BB'D) = (OO')$ إذن $(OO') \parallel (AA') \parallel (BB')$ و بنفس الطريقة:

لدينا النقط B , C , D و E متساوية.

لدينا $(IH) \parallel (BK)$ و $(BK) \subset (JCK)$ إذن $(IH) \parallel (JCK)$.

تمرين 8: ليكن $ABCDA'B'C'D'$ متوازي مستطيلات.

ولتكن O و O' مركز المستطيلين $ABCD$ و $A'B'C'D'$ على التوالي.


(1) أنشئ شكل مناسب.

(2) بين أن النقط C , A' , A , D' , B' , B متساوية.

(3) بين أن $(AA'C) \cap (BB'D) = (OO')$ و $(AA') \parallel (BB')$.

(4) بين أن $(OO') \parallel (CC') \parallel (DD')$ و $(OO') \parallel (AA') \parallel (BB')$.

الجواب:



(1) في المستطيل $AA'B'B$ لدينا $(AA') \parallel (BB')$.

(2) في المستطيل $BB'CC'$ لدينا $(BB') \parallel (CC')$.

من (1) و (2) نستنتج أن $(AA') \parallel (CC')$.

و منه فان النقط C , A' , A , D' متساوية.

و بنفس الطريقة نبين أن $(BB') \parallel (DD')$ و منه فان النقط D , B' , B , D' متساوية.

(3) لدينا O مركز المستطيل $ABCD$ إذن $O \in (BD)$ و $O \in (OB)$ منه $O \in (BB'D)$ و O' مركز المستطيل $A'B'C'D'$ إذن $O' \in (B'D')$ و $O' \in (BB'D)$ منه $O' \in (BB'D)$.

(α) $(OO') \subset (BB'D)$

لدينا O مركز المستطيل $ABCD$ إذن $O \in (AC)$ و منه $O \in (AA'C)$.

و O' مركز المستطيل $A'B'C'D'$ إذن $O' \in (A'C')$ و $O' \in (AA'C')$ منه $O' \in (AA'C')$.

(β) $(OO') \subset (AA'C')$

لدينا $(AA'C) \neq (BB'D)$ و نقط غير D و C , B' , B , A' , A متساوية.

و منه (α) و (β) نستنتج أن: $(AA'C) \cap (BB'D) = (OO')$ هذا هو المطلوب.

(4) لدينا $(BB') \subset (BB'D)$ و $(AA') \subset (AA'C)$ و $(BB') \parallel (AA')$ و $(AA') \cap (BB'D) = (OO')$ و $(OO') \parallel (AA') \parallel (BB')$ إذن $(OO') \parallel (CC') \parallel (DD')$ و بنفس الطريقة:

$(CC') \subset (ACC')$ و $(DD') \subset (BB'D)$ و $(ACC') \cap (BB'D) = (OO')$ و $(OO') \parallel (CC') \parallel (DD')$.

إذن $(OO') \parallel (CC') \parallel (DD')$.