

النهايات - الاشتقاق

تأويلات هندسية - دراسة الدوال

النهايات

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} +\infty & n \text{ زوجي} \\ -\infty & n \text{ فردي} \end{cases} \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \text{ لدينا : } n \text{ من } \mathbb{N}^* \text{ لكل}$$

2. نهاية دالة حدودية عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية حدها الأعلى درجة

3. نهاية دالة جذرية هي خارج نهاية حدها الأعلى درجة في البسط على حدها الأعلى درجة في المقام

4. جداول النهايات:

$\lim f$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim f + g$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	شكل غير محدد

$\lim f$	l	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$\lim g$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim f \times g$	$l \times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	شكل غير محدد

$\lim f$	$l \neq 0$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$\lim \frac{1}{f}$	$\frac{1}{l}$	$+\infty$	$-\infty$	0	0


$\lim f$	l	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	l	$\pm\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim g$	$l' \neq 0$	0^+	0^-	0^+	0^-	$\pm\infty$	$\pm\infty$	0^+	0^-	0^+	0^-
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{l}{l'}$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0	شكل غير محدد	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

الفروع اللانهائية

$$x = a \text{ يقبل مقارب عمودي معادلته } C_f \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$$

$$-\infty \text{ أو بجوار } +\infty \text{ يقبل مقارب أفقي معادلته } y = b \text{ } C_f \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$$

$$-\infty \text{ أو بجوار } +\infty \text{ يقبل مقارب مائل معادلته } y = ax + b \text{ } C_f \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$



الإشتقاق و تأويلاته الهندسية

(C_f) يقبل مماسا في النقطة $l = f'(a)$ معامل الموجه و معادلته : $y = f'(a).(x - a) + f(a)$	\leftrightarrow	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l \in \mathbb{R}$ $l = f'(a)$	\leftrightarrow	f قابلة للاشتقاق في a
(C_f) يقبل مماسا في النقطة $A(a, f(a))$ معامل الموجه و معادلته : $l = f'_d(a)$ $y = f'_d(a).(x - a) + f(a)$		$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l \in \mathbb{R}$ $l = f'_d(a)$		f قابلة للاشتقاق في a على اليمين
(C_f) يقبل مماسا في النقطة $A(a, f(a))$ معامل الموجه و معادلته : $l = f'_g(a)$ $y = f'_g(a).(x - a) + f(a)$		$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l \in \mathbb{R}$ $l = f'_g(a)$		f قابلة للاشتقاق في a على اليسار
(C_f) يقبل مماسا في النقطة $l = f'(a)$ معامل الموجه و معادلته : $y = f'(a).(x - a) + f(a)$		f قابلة للاشتقاق في a على اليمين ✓ f قابلة للاشتقاق في a على اليسار ✓ $f'_d(a) = f'_g(a) = f'(a)$ ✓		f قابلة للاشتقاق في a

- إذا كانت f قابلة للاشتقاق في a على اليمين و f قابلة للاشتقاق في a على اليسار و $f'_d(a) \neq f'_g(a)$ فإن f غير قابلة للاشتقاق في a . في هذه الحالة (C_f) يقبل نصفي مماس مختلفان في النقطة $A(a, f(a))$ معاملاهما الموجهان $f'_d(a)$ و $f'_g(a)$ و النقطة $A(a, f(a))$ تسمى نقطة مزواة
- إذا كانت $f'(a) = 0$ فإن (C_f) يقبل مماس أفقي في $A(a, f(a))$

f غير قابلة للاشتقاق في a على اليسار $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$	f غير قابلة للاشتقاق في a على اليمين $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$
(C_f) يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل في النقطة $A(a, f(a))$	(C_f) يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى في النقطة $A(a, f(a))$

$f \text{ غير قابلة للاشتقاق في } a \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$ <p style="text-align: center;">على اليسار</p> <p style="text-align: center;">(C_f) يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى في النقطة A(a, f(a))</p>	$f \text{ غير قابلة للاشتقاق في } a \Leftrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty$ <p style="text-align: center;">على اليمين</p> <p style="text-align: center;">(C_f) يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل في النقطة A(a, f(a))</p>
---	---

❖ مشتقات الدوال الاعتيادية

المجال I	الدالة المشتقة f'	الدالة f
\mathbb{R}	$x \mapsto 0$	$x \mapsto k$
\mathbb{R}	$x \mapsto nx^{n-1}$	$x \mapsto x^n \quad n \in \mathbb{N}^*$
$I =]-\infty, 0[$ أو $I =]0, +\infty[$	$x \mapsto nx^{n-1}$	$x \mapsto x^n \quad n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{-1\}$
$I =]0, +\infty[$	$x \mapsto rx^{r-1}$	$x \mapsto x^r \quad r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\}$
$I =]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \mapsto \sqrt{x}$
$I =]-\infty, 0[$ أو $I =]0, +\infty[$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	$x \mapsto \frac{1}{x}$

<p>✓ إذا كانت f و g قابلتين للاشتقاق على I و $\alpha \in \mathbb{R}$ فإن αf و $f + g$ و $f \times g$ قابلة للاشتقاق على I</p> <p>✓ بالإضافة إذا كانت $g \neq 0$ على I فإن $\frac{f}{g}$ و $\frac{1}{g}$ قابلة للاشتقاق على I</p> <p>✓ إذا كانت f قابلة للاشتقاق على I و g قابلة للاشتقاق على f(I) فإن $g \circ f$ قابلة للاشتقاق على I</p> <p>✓ إذا كانت f قابلة للاشتقاق على I و $f \geq 0$ على I فإن \sqrt{f} قابلة للاشتقاق على I</p> <p>✓ إذا كانت f قابلة للاشتقاق على I فإن f^n (n ∈ ℕ) قابلة للاشتقاق على I</p>


الدالة المشتقة	الدالة
$\alpha f'$	αf
$f' + g'$	$f + g$
$f' \times g + f \times g'$	$f \times g$
$-\frac{g'}{g^2}$	$\frac{1}{g}$
$\frac{f'g - fg'}{g^2}$	$\frac{f}{g}$
$f' \times g' \circ f$	$g \circ f$
$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$	\sqrt{f}

$nf'f^{n-1}$	f^n
--------------	-------


✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) \geq 0$ فإن f تزايدية على I
✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) \leq 0$ فإن f تناقصية على I
✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) > 0$ فإن f تزايدية قطعاً على I
✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) < 0$ فإن f تناقصية قطعاً على I

تعر منحنى و نقط الانعطاف:

✓ إذا كان $\forall x \in I \quad f''(x) \geq 0$ فإن (C_f) محدب




✓ إذا كان $\forall x \in I \quad f''(x) \leq 0$ فإن (C_f) مقعر



✓ إذا كانت f'' تنعدم و تغير إشارتها عند a فإن النقطة $I(a, f(a))$ هي نقطة انعطاف

✓ إذا كانت f' تنعدم و لا تغير إشارتها عند a فإن النقطة $I(a, f(a))$ هي نقطة انعطاف



مركز ومحور تماثل (C_f) :

$$\begin{cases} \forall x \in D_f : 2a-x \in D_f \\ \forall x \in D_f : f(2a-x) = f(x) \end{cases} \Leftrightarrow (C_f) \text{ محور تماثل ل } x=a \text{ المعادلة المستقيم ذي المعادلة } \diamond$$

$$\begin{cases} \forall x \in D_f : 2a-x \in D_f \\ \forall x \in D_f : f(2a-x) = 2b - f(x) \end{cases} \Leftrightarrow (C_f) \text{ مركز تماثل ل } \Omega(a,b) \text{ النقطة } \diamond$$