

الإحتمال

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1 \quad (*)$$

ونكتب p_i . $p(a_i) = p_i$. الروج (Ω, p) يسمى فضاء احتماليا متنهيا .

(2) احتمال حدث :

ليكن (Ω, p) يسمى فضاء احتماليا متنهيا و A حدثا .

احتمال الحدث A هو مجموع احتمالات الأحداث الإبتدائية التي تكونه . يعني .

إذا كان $\{p(A) = p(a_1) + p(a_2) + \dots + p(a_n)\}$ فإن $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

(3) خاصيات ليكن (Ω, p) يسمى فضاء احتماليا متنهيا .

(a) ليكن $A \cap B = \emptyset$ و A حدثين مختلفين بحسب

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

(b) ليكن B و A حدثين . لدينا $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.

(c) ليكن A حدثا و \bar{A} الحدث المضاد له . لدينا $p(A) = 1 - p(\bar{A})$.

(d) ليكن A_1, A_2, \dots, A_n أحداثا منفصلة متنى متنى ، لدينا

$$p(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = p(A_1) + p(A_2) + \dots + p(A_n)$$

(4) فرضية تساوي الإحتمالات

ليكن (Ω, p) يسمى فضاء احتماليا متنهيا بحيث يكون جميع الإمكانيات نفس الإحتمال

$$(*) \quad \frac{1}{card(\Omega)} \quad \text{جميع الأحداث الإبتدائية لها نفس الإحتمال هو}$$

$$p(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} \quad (*) \quad \text{ليكن } A \text{ حدثا . لدينا}$$

ملاحظة : إذا كان لجميع الأحداث الإبتدائية نفس الإحتمال فإن

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

(b) إن فرضية تساوي الإحتمالات يمكن أن تظهر في النص بعبارة صريحة أو بطريقة غير مباشرة

كما يلي : (نرد غير مغشوش - قطعة نقود غير مغشوشة- كرات لا يمكن التمييز بينها للملمس)

(c) إذا كانت التجربة مغشوشة يجب أولا حساب احتمال الأحداث الإبتدائية باستعمال المعلميات

حول عملية الغش واستعمال الخاصية : إذا كان $\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ فإن

$$p(A) = p(a_1) + p(a_2) + \dots + p(a_n)$$

مثال : نرمي نرد وجهه السطة مرقمة من 1 إلى 6 وعشوش بحيث الأرقام الزوجية لها نفس

الإحتمال والأرقام الفردية لها نفس الإحتمال ، واحتمال رقم زوجي مضاعف احتمال رقم فردي

أحسب احتمال الحدث A "الحصول على رقم مضاعف لـ 3"

الحل : لدينا $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

لنحسب احتمال الأحداث الإبتدائية .

$p(2) = p(4) = p(6) = 2x$ ، $p(1) = p(3) = p(5) = x$ نضع

$p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) = 1$ لدينا

$$\text{يعني} \quad x = \frac{1}{9} \quad \text{إذن} \quad x + 2x + x + 2x + x + 2x = 1$$

$$p(2) = p(4) = p(6) = \frac{2}{9} , \quad p(1) = p(3) = p(5) = \frac{1}{9}$$

$$p(A) = p(3) + p(6) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} = \frac{1}{3} \quad (*) \quad \text{لدينا} \quad A = \{3, 6\}$$

(5) الإحتمال الشرطي :

ليكن A و B حدثين بحيث $p(A) \neq 0$ ،

(I) العداد

(1) رئيسي مجموعة

نسمى رئيسي مجموعة متهبة E عدد عناصرها ، ونرمز له بـ $card(E)$

(2) عاملي عدد طبيعي

ليكن n عدد طبيعي . نسمى عاملي n ، العدد الذي نرمز له بـ $n!$ والمعرف بما يلي :

. $n \neq 0$ إذا كان $n! = 1.2.3.....n$ (*)

. $0! = 1$ (*)

(3) مبدأ الجداء .

إذا كان علينا أن ننجز p اختيارا ، وكان لدينا :

. n_1 طريقة لل اختيار رقم 1 .

. n_2 طريقة لل اختيار رقم 2 .

. \vdots \vdots \vdots

. n_p طريقة لل اختيار رقم p .

فإن عدد الطرق التي تسمى هذه الأختيارات هو $n_1.n_2.....n_p$.

(4) الترتيبات - التبديلات - التاليفات

لتكن $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ مجموعة مكونة من n عنصر . و

(a) نسمى ترتيبة لـ p عنصر من بين n عناصر E أو ترتيبة من الرتبة p لعناصر

كل ترتيب لـ p عنصر مختلف من E . ونرمز لترتيبية بـ (x_1, x_2, \dots, x_n) .

(b) عدد هذه الترتيبات هو العدد الذي نرمز له بـ A_n^p والمعرف بما يلي :

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = \underbrace{n(n-1)(n-2).....(n-p+1)}_{n \text{ facteurs}}$$

(c) نسمى تبديلة لعناصر E كل ترتيبة لـ n عنصر من بين n عناصر

(d) عدد هذه التبديلات هو $A_n^n = n(n-1)(n-2).....1 = n!$

(e) نسمى تاليفية لـ p عنصر من بين n عناصر E أو تاليفية من الرتبة p لعناصر

كل جزء مكون من p عنصر مختلف من E . ونرمز لتاليفية بـ $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$.

(f) عدد هذه التاليفات هو العدد الذي نرمز له بـ C_n^p والمعرف بما يلي :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{\overbrace{n(n-1)(n-2).....(n-p+1)}^{p \text{ facteurs}}}{\overbrace{p(p-1)(p-2).....1}^{p(p-1)(p-2).....1}}$$

(5) خاصيات

$C_n^p = C_n^{n-p} \quad C_n^1 = C_n^{n-1} = n \quad C_n^0 = C_n^n = 1$ **(a)**

$$. \quad C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k \quad \text{الصيغة الحدانية .}$$

(c) لتكن E مجموعة مكونة من n عنصر . عدد أجزاء E هو 2^n

(II) الإحتمال

(1) تعريف .

نعتبر المجموعة $\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ (كون الإمكانيات)

نقول إننا قد عرفنا احتمالا على Ω إذا وفقط إذا ربطنا كل عنصر a_i من Ω بعدد

حقيقي p_i بحيث : $0 \leq p_i \leq 1$ (*)

$$E(X^2) = x_1^2 p(X=x_1) + x_2^2 p(X=x_2) + \dots + x_n^2 p(X=x_n)$$

$$x_1^2 \alpha_1 + x_2^2 \alpha_2 + \dots + x_n^2 \alpha_n$$

الإنحراف الطراسي .

الإنحراف الطراسي لمتغير عشوائي X هو العدد الذي نرمز له بـ $\sigma(X)$ والمعرف بما يلي:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

دالة التجزئي

نسمى دالة التجزئي لمتغير العشوائي X الدالة التي نرمز لها بـ F والمعرف بما يلي:

$$(\forall x \in \mathbb{R}): F(x) = p(X < x)$$

ونقول إننا قد حددنا الدالة F إذا قمنا بحساب $F(x)$ لكل x من \mathbb{R} .

مثال : نعتبر الصندوق U نسحب تاتيا 3 كرات من الصندوق . ليكن

X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات البيضاء المحصل عليها .

(a) القيم التي يأخذها المتغير X هي :

$$\{3N\} \text{ يعني الحصول على } X=0 \quad (*)$$

$$\{1B, 2N\} \text{ يعني الحصول على } X=1 \quad (*)$$

$$\{2B, 1N\} \text{ يعني الحصول على } X=2 \quad (*)$$

$$\{3B\} \text{ يعني الحصول على } X=3 \quad (*)$$

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$$

إذن قانون احتمال X

$$p(X=1) = \frac{C_3^1 C_4^2}{C_7^3} = \frac{18}{35} \quad (*) \quad p(X=0) = \frac{C_4^3}{C_7^3} = \frac{4}{35} \quad (*)$$

$$p(X=3) = \frac{C_3^3}{C_7^3} = \frac{1}{35} \quad (*) \quad p(X=2) = \frac{C_3^2 C_4^1}{C_7^3} = \frac{12}{35} \quad (*)$$

| | | | | |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| x_i | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $p(X=x_i)$ | $\frac{4}{35}$ | $\frac{18}{35}$ | $\frac{18}{35}$ | $\frac{1}{35}$ |

$$E(X) = 0 \cdot \frac{4}{35} + 1 \cdot \frac{4}{35} + 2 \cdot \frac{18}{35} + 3 \cdot \frac{1}{35} = \frac{49}{35} \quad (c)$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{4}{35} + 1^2 \cdot \frac{4}{35} + 2^2 \cdot \frac{18}{35} + 3^2 \cdot \frac{1}{35} = \frac{75}{35} \quad (\text{لدينا})$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{75}{35} - \left(\frac{49}{35}\right)^2 = \frac{224}{352} \quad (\text{إذن})$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \frac{\sqrt{224}}{35} \quad (\text{لدينا})$$

(f) دالة التجزئي . نحسب $F(x)$ لكل x من \mathbb{R} .

$$F(x) = p(X < x) = p(\emptyset) = 0 \quad (\text{إذا كان } x \leq 0)$$

$$F(x) = p(X < x) = p(X=0) = \frac{4}{35} \quad (\text{إذا كان } 0 < x \leq 1)$$

(*) إذا كان $2 < x \leq 3$

$$F(x) = p(X < x) = p(X=0) + p(X=1) = \frac{22}{35} \quad (\text{إذا كان } 1 < x \leq 2)$$

(*) إذا كان $2 < x \leq 3$

$$F(x) = p(X < x) = p(X=0) + p(X=1) + p(X=2) = \frac{34}{35} \quad (\text{إذا كان } x > 3)$$

$$F(x) = p(X < x) = p(X=0) + p(X=1) + p(X=2) + p(X=3) = 1$$

احتمال الحدث B علماً أن الحدث A متحقق هو $p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$

صيغة الإحتمالات المركبة

ل لكن A و B حدثين بحيث $p(A) \neq 0$

$$p(A \cap B) = p(A)p(B/A)$$

صيغة الإحتمالات الكلية

(a) (a) نقول إن الأحداث A_1 و A_2 و و A_n تكون تجربينا لـ Ω إذا وفقط إذا كان

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \quad (*) \quad (\forall i \neq j): A_i \cap A_j = \emptyset \quad (*)$$

(b) تكون الأحداث A_1 و A_2 و و A_n تجربينا لـ Ω إذا وفقط إذا كانت متصلة مثنى مثنى وتكون هي الأحداث المسكونة .

صيغة الإحتمالات الكلية

ليكن A_1 و A_2 و و A_n أحداثاً تكون تجربينا لـ Ω . لكل حدث لدينا:

$$p(B) = p(A_1)p(B/A_1) + \dots + p(A_n)p(B/A_n)$$

الاستقلالية

(a) نقول إن الحدثين A و B مستقلان إذا وفقط إذا كان

$$p(A \cap B) = p(A).p(B)$$

(b) يكون الحدثان A و B مستقلين إذا وفقط إذا كان $p(B/A) = p(B)$.

(c) يعني إذا كان تحقق أحدهما لا يؤثر على الآخر .

(d) نعتبر تجربة مكونة من n اختبار مستقلة مثنى مثنى .

ليكن A حدثاً احتمال تتحققه في اختبار واحد هو p

ول يكن B الحدث: "الحدث A يتحقق k مرة بالضبط خلال n اختبار"

$$p(B) = C_n^k (p(A))^k (1-p(A))^{n-k}$$

ملاحظة بصفة عامة من أجل حساب احتمال تباع ما يلي :

(a) إذا كان لدينا السحب الثاني أو الإختيار الثاني نستعمل $p(A)$ و C_n^p ،

(b) إذا كانت تجربة مكونة من عدة اختبارات ، نفكك هذه التجربة إلى عدة اختبارات يمكن فيها اختيار الثاني حتى تتجنب استعمال الترتيبات والتطبيقات . ونرمز لكل إمكانية بـ :

(x_1, x_2, \dots, x_n) حيث x_i نتيجة التجربة رقم i .

المتغير العشوائي .

(1) نسمى متغير عشوائي كل تطبيق X يربط كل إمكانية من Ω بعدد حقيقي ، ونرمز للقيمة التي يأخذها المتغير X بـ $X(\Omega)$.

(2) ليكن X متغير عشوائي بحيث $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

نقل إننا قد حددنا قانون احتمال X ، إذا قمنا بحساب $p(X=x_i)$ لكل $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ونلخص هذه النتائج في جدول كما يلي :

| x_i | x_1 | x_2 | | x_n |
|------------|------------|------------|-------|------------|
| $p(X=x_i)$ | α_1 | α_2 | | α_n |

الأمل الرياضي .

الأمل الرياضي لمتغير عشوائي X هو العدد الذي نرمز له بـ $E(X)$ والمعرف بما يلي :

$$E(X) = x_1 p(X=x_1) + x_2 p(X=x_2) + \dots + x_n p(X=x_n)$$

$$= x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n$$

المغایرة

المغایرة لمتغير عشوائي X هو العدد الذي نرمز له بـ $V(X)$ والمعرف بما يلي :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$