

← تكامل دالة متصلة على قطعة:

لتكن f دالة متصلة على مجال I و F دالة أصلية للدالة f على المجال I
و a و b عنصرين من المجال I

تكامل الدالة f من a إلى b هو العدد الحقيقي :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

تعريف:

← خاصيات:

الخطانية:

$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$	$\int_a^a f(x) dx = 0$
$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$	$(k \in \mathbb{R}) \quad \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$

علاقة شال:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

← التكامل والثلث:

$\forall x \in [a, b] \quad f(x) \leq g(x)$ إذا كان : $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ فإن :	$\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0$ إذا كان : $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ فإن :
---	---

← القيمة المتوسطة:

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a, b]$


القيمة المتوسطة للدالة على المجال هي العدد الحقيقي :

← اطلاعه بالأحزاء:

لتكن u و v دالتين قابلتين للاشتراق على مجال I بحيث الدالتين u' و v' متصلتين على المجال I
و a و b عنصرين من المجال I

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

← مساحة حيز



ليكن المستوى منسوباً إلى معلم متعامد (o, \vec{i}, \vec{j})
وحدة المساحة $u.A$ هي مساحة المستطيل المحدد بالنقطة o و المتجهتين \vec{i} و \vec{j}

$$1.u.A = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$$






لتكن f و g دالتين متصلتين على مجال $[a, b]$ مساحة الحيز المحصور بين المنحنيين C_f و C_g ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتهما:

$$x = b \quad x = a \\ \left(\int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right) . u.A \quad \text{هي:}$$


لتكن f دالة متصلة على مجال $[a, b]$ مساحة الحيز المحصور بين المنحنى C_f ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتهما:

$$x = b \quad x = a \\ \left(\int_a^b |f(x)| dx \right) . u.A \quad \text{هي:}$$

حالات خاصة:

رسم توضيحي	ملاحظات	مساحة الحيز البنفسجي في الرسم هي:
	f موجبة على المجال $[a, b]$	$\left(\int_a^b f(x) dx \right) . u.A$
	f سالبة على المجال $[a, b]$	$\left(\int_a^b -f(x) dx \right) . u.A$
	<ul style="list-style-type: none"> • f موجبة على المجال $[a, c]$ • f سالبة على المجال $[c, b]$ 	$\left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^b -f(x) dx \right) . u.A$
	(C_g) يوجد فوق (C_f) على المجال $[a, b]$	$\left(\int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right) . u.A$
	<ul style="list-style-type: none"> • (C_g) فوق (C_f) على المجال $[a, c]$ • (C_f) فوق (C_g) على المجال $[c, b]$ 	$\left(\int_a^c (f(x) - g(x)) dx + \int_c^b (g(x) - f(x)) dx \right) . u.A$

حسن حمد:



حجم المجسم المولد بدوران المنحنى (C_f) حول محور الأفاصيل دورة كاملة في مجال $[a; b]$ هو:

$$V = \left[\int_a^b \pi (f(x))^2 dx \right] u.v$$
 وحدة الحجم uv