

(a) **ليكن** E و F جزئين من المستوى .
 $h(E \cap F) = h(E) \cap h(F)$

(b) **إذا كانت** $M \in E \cap F$ **فإن** (11)
التحاكي يحافظ على التعامد والتوازي يعني :
 صورة مستقيمين متعمدين هما مستقيمان متعمدان
 وصورة مستقيمين متوازيين هما مستقيمان متوازيان .
(12) الصيغة التحليلية لـ التحاكي .

نفترض أن المستوى منسوب إلى معلم متعمد (O, i, j) .
(a) مثال 1: ليكن h تحاكي مركزه $\Omega(1, 2)$ ونسبته $= 2$.
 من أجل تحديد الصيغة التحليلية للتحاكي h نتبع ملابي :
 ليكن (x', y') $M(x, y)$ بحيث $M = M(x', y')$ ونقوم
 بحساب x' و y' بدلالة x و y .

$$\overrightarrow{\Omega M}' = 2\overrightarrow{\Omega M} \quad \text{يعني } h(M) = M$$

ولدينا $(2x - 2, 2y - 4)$ و $\overrightarrow{\Omega M}'(x' - 1, y' - 2)$

$$\begin{cases} x' = 2x - 1 \\ y' = 2y - 2 \end{cases} \quad \text{يعني} \quad \begin{cases} x' - 1 = 2x - 2 \\ y' - 2 = 2y - 4 \end{cases}$$

$$h : \begin{cases} x' = 2x - 1 \\ y' = 2y - 2 \end{cases} \quad \text{إذن الصيغة التحليلية لـ } h \text{ هي :}$$

ملاحظة: إذا أردنا تحديد صورة نقطة A بـ h نعرض x و y بـ إحداثيات A ونحصل على إحداثيات $h(A)$.

(b) مثال 2.

نعتبر التطبيق f الذي صيغته التحليلية هي :
 $f : \begin{cases} x' = 3x + 2 \\ y' = 3y - 4 \end{cases}$

من أجل تحديد طبعة f نبحث عن النقط الصامدة بـ حل النظمة

يعني $\begin{cases} x' = x \\ y' = y \end{cases}$ إذن f تقبل نقطة صامدة وحيدة
 هي $\Omega(-1, 2)$.

ثم نأخذ $M(x', y')$ و $M(x, y)$ بحيث $M = M(x', y')$

لدينا إذن $\overrightarrow{\Omega M}'(x + 1, y' - 2)$ يعني $\begin{cases} x' = 3x + 2 \\ y' = 3y - 4 \end{cases}$

$\overrightarrow{\Omega M}'(3x + 3, 3y - 6)$ يعني $\overrightarrow{\Omega M}'(3x + 2 + 1, 3y - 4 - 2)$

ولدينا $\overrightarrow{\Omega M}' = 3\overrightarrow{\Omega M}$ إذن $3\overrightarrow{\Omega M}(3x + 3, 3y - 6)$

وبالتالي f تحاكي مركزه $\Omega(-1, 2)$ ونسبته $= 3$.

(13) بعض التقنيات .

(a) لكي نحدد مركز التحاكي h . نسميه Ω نبحث عن نقطتين A و B وصورتاهما A' و B' . لدينا $A' = h(A)$ إذن Ω و A' مستقيمية و منه $\Omega \in (AA')$. لدينا $B' = h(B)$ إذن Ω و B' و B مستقيمية و منه $\Omega \in (BB')$ وبالتالي Ω هي نقطة تقاطع (AA') و (BB') .

(I) التحاكي

(A) تعريف

لتكن Ω نقطة و k عدد حقيقي غير منعدم .
 التحاكي الذي مركزه Ω ونسبته k هو التطبيق
 الذي نرمز له بـ (Ω, k) والذي يربط
 كل نقطة M من (P) بالنقطة ' M ' بحيث
 $\overrightarrow{\Omega M}' = k \overrightarrow{\Omega M}$ '

(B) الخاصية المميزة

تكون النقاطان ' M ' و ' N ' صوري النقاطين M و N على التوالي
 بـ التحاكي h إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي $k \neq 1$ بحيث
 $\overrightarrow{M'N'} = k \overrightarrow{MN}$ '

(C) خصائص

ل يكن h تحاكي مركزه Ω ونسبته k .
 $\overrightarrow{\Omega M}' = k \overrightarrow{\Omega M}$ تكافىء $h(M) = M'$ (1)

إذا كان ' M ' و ' N ' تكافىء $h(M) = M'$ و $h(N) = N'$ فـ $\overrightarrow{M'N'} = k \overrightarrow{MN}$ '

(a) $h(\Omega) = \Omega$ (نقول إن Ω صامدة بالـ التحاكي h)

(b) $M = \Omega$ $h(M) = M'$ (b)

(c) هذا يعني أن Ω هي النقطة الوحيدة الصامدة بالـ التحاكي h .
 إذا كان ' M ' و ' M' مستقيمية .

(d) (a) التـ تحـاـكـي يـ حـافـظ عـلـى الـ مـرـجـع يـعـنـي :

إذا كان G مـرجـع $\{(A, \alpha), (B, \beta)\}$ فإن G مـرجـع $\{(A', \alpha'), (B', \beta')\}$

(e) (b) التـ تحـاـكـي يـ حـافـظ عـلـى الـ مـنـصـف يـعـنـي :

إذا كان I مـنـصـف $[AB]$ فإن I مـرجـع $[A'B']$

(f) (c) التـ تحـاـكـي يـ حـافـظ عـلـى مـعـالـم اـسـقـامـيـة مـتـجـهـيـن يـعـنـي :

إذا كان $A'B' = \alpha C'D'$ فإن ' $AB = \alpha CD$ '

(g) (d) التـ تحـاـكـي يـ حـافـظ عـلـى اـسـقـامـيـة 3 نقطـ يـعـنـي :

إذا كانت النـقط A و B و C مـسـقـيمـيـة فـان صورـها A' و B' و C' مـسـقـيمـيـة .

(h) (e) التـ تحـاـكـي لا يـ حـافـظ عـلـى الـ مـسـافـة لـكـن لـدـيـنا .

إذا كان ' $A'B' = |k|AB$ ' فإن $h(B) = B'$ و $h(A) = A'$

(i) (f) التـ تحـاـكـي يـ حـافـظ عـلـى قـيـاسـ الزـوـاـيا الـهـنـدـسـيـة يـعـنـي '

(j) (g) صـورـة الـقطـعة $[AB]$ بـ التـ تحـاـكـي h هي الـقطـعة $[A'B']$

(k) (h) صـورـة الـمسـقـيم (AB) بـ التـ تحـاـكـي h هي الـمسـقـيم $(A'B')$

(l) (i) صـورـة الـمسـقـيم (D) هو الـمسـقـيم (D') يـواـزـي (D)

(m) (j) من أجل تحديد صورة مـسـقـيم (D) بـ h يـكـفي تحـديـد صـورـة نقطـتين A و B من D وسيـكون $(A'B') = h(D)$

(n) (k) أو تحـديـد صـورـة نقطـة واحدة A وسيـكون $(D) = h(D)$ هو الـمسـقـيم الـمارـمـاـنـي A وـ المـواـزـيـلـلـلـمـسـقـيم $(h(A)) = A'$.

(o) (l) إذا كان (D) مـسـقـيـما مـارـمـاـنـيـا فـان $(D) = h(D)$

(p) (m) نـقولـ إن (D) صـامـدـ إـجمـالـيـا .

(q) (n) صـورـة الدـائـرـة $C(O, r)$ بـ التـ تحـاـكـي h هي الدـائـرـة $C'(O', |k|r)$

(r) (o) مع $O' = h(O)$

III) الإزاحة

(A) تعريف .

لتكن \vec{u} متجهة . الإزاحة التي متوجهتها \vec{u} هي التطبيق الذي نرمز له بـ $t_{\vec{u}}$ والذي يربط كل نقطة M من M' بالنقطة ' M بحيث " $\vec{MM}' = \vec{u}$ " .

(B) الخاصية المميزة

تكون النقطتان ' M و ' N صورتي النقطتين M و N على التوالي بالإزاحة $t_{\vec{u}}$ إذا وفقط إذا كان $\vec{M}'N' = \vec{MN}$.

(C) خصيات

جميع الخصيات المتعلقة بالتحاكي تبقى صحيحة بالنسبة للإزاحة ، ماعدا (1) و (2) و (3) و (4) و (6) و (8cde) و (9) و (12) و (13abd) ولدينا :

(6) الإزاحة تحافظ على المسافة .

(8e) إذا كان (D) يوازي حامل \vec{u} (يعني \vec{u} موجهة لـ (D)) فلن $t_{\vec{u}}(D) = (D)$

(9) صورة الدائرة $C(O, r)$ بالازاحة $t_{\vec{u}}$ هي الدائرة $C'(O', r')$ مع $O' = t_{\vec{u}}(O)$

ملاحظة

. $\vec{MM}' = \vec{u}$ تكافئ $t_{\vec{u}}(M) = M'$ **(a)**

(b) إذا كان ' M = M' و $t_{\vec{u}}(N) = N'$ فإن $\vec{M}'N' = \vec{MN}$

III) التمايل المحوري

(A) تعريف .

لتكن (Δ) مستقيما التمايل المحوري الذي محوره (Δ) هو التطبيق الذي نرمز له بـ $S_{(\Delta)}$ والذي يربط كل نقطة M من M' بالنقطة ' M بحيث يكون (Δ) واسط القطعة $[MM']$.

(B) خصيات

جميع الخصيات المتعلقة بالتحاكي تبقى صحيحة بالنسبة للتمايل المحوري ، ماعدا (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (8e) و (9) و (13abd) ولدينا :

(6) التمايل المحوري يحافظ على المسافة .

(8e) إذا كان (D) $\perp (\Delta)$ فإن $t_{(\Delta)}(D) = (D)$ فإن $t_{(\Delta)}(D) // (D)$

* إذا كان $(D) // (\Delta)$ فإن $t_{(\Delta)}(D) // (D)$

(9) صورة الدائرة $C(O, r)$ بالتمايل المحوري $S_{(\Delta)}$ هي الدائرة $C'(O', r')$ مع $O' = S_{(\Delta)}(O)$

ملاحظة

. $[MM']$ تكافئ $S_{(\Delta)}(M) = M'$ **(a)**

(b) إذا كان $M \in (\Delta)$ تكافئ $S_{(\Delta)}(M) = M'$ صادم نقطة بنتقطة .

(b) من أجل تحديد نسبة تحاكي h نسميه k و هناك إمكانيتان : (*) نبحث عن المركز Ω ونقطة A وصورتها A' .

لدينا ' $\vec{\Omega A}' = k \vec{\Omega A}$ إذن $h(A) = A'$ ، ونقوم بحساب ' $\vec{\Omega A}'$ بدالة $\vec{\Omega A} = k \vec{\Omega A}$ ونستنتج أن $k = \alpha$ أو نمر إلى القياس الجبري $k = \frac{\vec{\Omega A}'}{\vec{\Omega A}}$ يعني $\vec{\Omega A}' = k \vec{\Omega M}$

*) نبحث عن نقطتين A و B وصورتاهم A' و B' . لدينا $\vec{A}'B' = k \vec{AB}$ ونتبع نفس الطريقة السابقة .

(c) إذا أردنا أن نبين أن ' I منتصف $[A'B']$ [نبحث عن I و A و B] بحيث ' $I = I'$ و $h(I) = I'$ و $h(B) = B'$ و $h(A) = A'$ ونستعمل الخاصية $[AB]$. لدينا I مننصف $[AB]$ إذن ' I مننصف $[A'B']$.

(d) لكي نبين أن Ω و I و J مستقيمية يكفي أن نبين أن $h_{(\Omega,k)}(I) = J$

(e) لكي نحدد صورة نقطة M هناك عدة طرق من بينها : (*) نستعمل التعريف $\vec{\Omega M}' = k \vec{\Omega M}$

*) إذا كان M مننصف قطعة $[AB]$ [نستعمل $(5b)$] .

*) إذا كانت $\vec{AM} = \alpha \vec{AB}$ نستعمل $(5c)$.

*) إذا كانت M تقاطع جزئين نستعمل (10) .

(لدينا $(h(M)) \in h(E) \cap h(F)$ إذن $M \in E \cap F$)

*) إذا كانت لدينا الصيغة التحليلية نستعملها .

II) التمايل المركزي

(A) تعريف .

لتكن Ω نقطة التمايل المركزي الذي مركزه Ω هو التطبيق الذي نرمز له بـ S_{Ω} والذي يربط كل نقطة M من M' بالنقطة ' M بحيث $\vec{\Omega M}' = -\vec{\Omega M}$ يعني Ω مننصف $[MM']$

(B) الخاصية المميزة

تكون النقطتان ' M و ' N صورتي النقطتين M و N على التوالي بتماثل مركزي S_{Ω} إذا وفقط إذا كان $\vec{M}'N' = -\vec{MN}$.

(C) خصيات

جميع الخصيات المتعلقة بالتحاكي تبقى صحيحة بالنسبة للتماثل المركزي مع تعويض $k \rightarrow -k$ ، ماعدا (6) و (9) حيث تصبح .

(6) التمايل المركزي يحافظ على المسافة يعني .

إذا كان ' $A'B' = AB$ و $h(B) = B'$ فإن $h(A) = A'$

(9) صورة الدائرة $C(O, r)$ بالتماثل المركزي S_{Ω} هي الدائرة $C'(O', r')$ مع $O' = S_{\Omega}(O)$

ملاحظة

. $[MM']$ تكافئ $S_{\Omega}(M) = M'$ **(a)**

(b) إذا كان ' $S_{\Omega}(N) = N'$ و $S_{\Omega}(M) = M$ فإن $\vec{M}'N' = -\vec{MN}$