

# دراسة الدوال

4) اشتقاق دالة على مجال - الدالة المشتقة	
<b>(a)</b> نقول إن $f$ قابلة للإشتقاق على مجال مفتوح $I$ إذا كانت قابلة للإشتقاق في كل نقطة من $I$	
<b>(b)</b> نقول إن $f$ قابلة للإشتقاق على المجال $[a, b]$ إذا كانت قابلة للإشتقاق على المجال $]a, b[$ وعلى يمين $a$ وعلى يسار $b$ .	
<b>(c)</b> إذا كانت $f$ قابلة للإشتقاق على $I$ فإن الدالة $f': x \rightarrow f'(x)$ تسمى الدالة المشتقة	
<b>(d)</b> إذا كانت $f'$ قابلة للإشتقاق على مجال $I$ فإن الدالة المشتقة للدالة $f'$ تسمى المشتقة الثانية للدالة $f$ ونرمز لها بـ $f''$ .	
<b>(e) الدوال المشتقة لبعض الدوال الاعتيادية .</b>	
$(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$ (10)	$(a)' = 0$ (1)
$(\frac{1}{f})' = \frac{-f'}{f^2}$ (11)	$(x)' = 1$ (2)
	$(ax)' = a$ (3)
	$(f(ax+b))' = af'(ax+b)$ (12)
$(\sin x)' = \cos x$ (13)	$(x^n)' = nx^{n-1}$ (4)
	$(\frac{1}{x})' = \frac{-1}{x^2}$ (5)
	$(\sin(ax+b))' = a \cos(ax+b)$ (14)
$(\cos x)' = -\sin x$ (15)	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (6)
	$(f+g)' = f'+g'$ (7)
	$(\cos(ax+b))' = -a \sin(ax+b)$ (16)
$(\tan x)' = 1 + \tan^2 x$ (17)	$(fg)' = f'g + g'f$ (8)
$(f^n)' = nf'f^{n-1}$ (18)	$(af)' = af'$ (9)
	$(\tan(ax+b))' = a(1 + \tan^2(ax+b))$ (19)
<b>ملاحظة (a)</b> لتكن $f$ دالة معرفة على مجال $I$ ولا تحتوي على $\sqrt{\quad}$ .	
لكي ندرس اشتقاق $f$ في $x_0$ نتحقق هل $f$ تغير صيغتها في $x_0$ أم لا ؟	
* إذا كنت $f$ لا تغير صيغتها في $x_0$ نقوم بحساب $f'(x)$ ونعوض $x$ بـ $x_0$ .	
* إذا كنت $f$ تغير صيغتها في $x_0$ ندرس الإشتقاق باستعمال معدل التغير.	
<b>(b)</b> إذا كانت $f'$ تتعدم في $x_0$ ( $f'(x_0) = 0$ ) فإن $C_f$ يقبل مماسا $(T)$ عند النقطة $M(x_0, f(x_0))$ موازيا لمحور الأفاصيل .	
5) تغيرات دالة	
لتكن $f$ دالة قابلة للإشتقاق على مجال $I$ .	
<b>(a)</b> تكون $f$ تزايدية على $I$ إذا فقط إذا كان $(\forall x \in I): f'(x) \geq 0$	
<b>(b)</b> تكون $f$ تزايدية قطعاً على $I$ إذا فقط إذا كان $(\forall x \in I): f'(x) > 0$ والأعداد التي تتعدم فيها $f'$ معدودة .	
<b>(c)</b> تكون $f$ تناقصية على $I$ إذا فقط إذا كان $(\forall x \in I): f'(x) \leq 0$	
<b>(d)</b> تكون $f$ تناقصية قطعاً على $I$ إذا فقط إذا كان $(\forall x \in I): f'(x) < 0$ والأعداد التي تتعدم فيها $f'$ معدودة .	

I) الإشتقاق	
1) تعاريف	
<b>(a)</b> تكون $f$ قابلة للإشتقاق في $x_0$ إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in IR$	العدد $l$ يسمى العدد المشتق للدالة $f$ في $x_0$ ونكتب $f'(x_0) = l$ .
<b>(b)</b> تكون $f$ قابلة للإشتقاق على يمين $x_0$ إذا فقط إذا كان :	$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in IR$ ونكتب $f'_d(x_0) = l$ .
<b>(c)</b> تكون $f$ قابلة للإشتقاق على يسار $x_0$ إذا فقط إذا كان :	$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in IR$ ونكتب $f'_g(x_0) = l$ .
<b>(d)</b> تكون $f$ قابلة للإشتقاق في $x_0$ إذا فقط إذا كانت قابلة للإشتقاق على يمين $x_0$ وعلى يسار $x_0$ و $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$ .	
<b>(e) *</b> $(f \text{ متصلة في } x_0) \Rightarrow (f \text{ قابلة للإشتقاق في } x_0)$	
<b>(*)</b> $(f \text{ غير قابلة للإشتقاق في } x_0) \Rightarrow (f \text{ غير متصلة في } x_0)$	
2) التاويل الهندسي :	
<b>(a)</b> إذا كانت $f$ قابلة للإشتقاق في $x_0$ فإن $C_f$ يقبل مماسا $(T)$ عند النقطة $M(x_0, f(x_0))$ معمله الموجه $f'(x_0)$ معادلته $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ وسيكون $C_f$ على أحد الأشكال التالية :	
<b>(b)</b> إذا كانت $f$ قابلة للإشتقاق على يمين $x_0$ فإن $C_f$ يقبل نصف مماس $(T_1)$ عند النقطة $M(x_0, f(x_0))$ معمله الموجه $f'_d(x_0)$ معادلته $y = f'_d(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ وسيكون $C_f$ على أحد الشكلين التاليين :	
<b>(c)</b> لدينا نتيجة مماثلة بالنسبة للإشتقاق على اليسار .	
<b>ملاحظة *</b> إذا كانت $f$ قابلة للإشتقاق على بين $x_0$ وعلى يسار $x_0$ و $f'_d(x_0) \neq f'_g(x_0)$ فإن $f$ غير قابلة للإشتقاق في $x_0$ إذن $C_f$ لا يقبل مماسا في $M$ لكنه يقبل نصفي مماس غير منطبقين وسيكون $C_f$ على أحد الأشكال :	
<b>(*)</b> إذا كانت $f$ قابلة للإشتقاق في $x_0$ فإن $C_f$ "لاينكسر" في $M$ وإذا كانت $f$ غير قابلة للإشتقاق في $x_0$ فإن $C_f$ "ينكسر" في $M$ ويكون زاوية . ونقول إن $M$ نقطة مزوات .	
3) الدالة التآلفية المماسية لدالة .	
<b>(a)</b> إذا كانت $f$ قابلة للإشتقاق في $x_0$ فإن الدالة $u(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ تسمى الدالة التآلفية المماسية للدالة $f$ في $x_0$	
<b>(b)</b> وإذا كان $a$ جد قريب من $x_0$ فإن $u(a)$ قيمة مقربة لـ $f(a)$ ( $f(a) = u(a)$ )	

## (6) مطراف دالة .

لتكن  $f$  دالة قابلة للإشتقاق على مجال  $I$  و  $x_0 \in I$  . يكون للدالة  $f$  مطرافا نسبيا في  $x_0$  إذا وفقط إذا كانت  $f'$  تتقدم وتغير الإشارة في  $x_0$ .

## (II) التمثيل المبياني لدالة

### (1) التفرع

لتكن  $f$  دالة قابلة للإشتقاق مرتين على مجال  $I$  .

(a) يكون  $C_f$  محدبا ( ) إذا وفقط إذا كان  $(\forall x \in I) : f''(x) \geq 0$

(b) يكون  $C_f$  مقعرا ( ) إذا وفقط إذا كان  $(\forall x \in I) : f''(x) \leq 0$

### (2) نقط انعطاف

(a) لتكن  $f$  دالة قابلة للإشتقاق في  $x_0$  و  $(T)$  المماس لـ  $C_f$  في

$M(x_0, f(x_0))$  نقول إن  $M$  نقطة انعطاف إذا كان  $C_f$  يغير التفرع في

$M$  ( $C_f$  يخترق  $(T)$ ) :

(b) لتكن  $f$  دالة قابلة للإشتقاق مرتين على مجال  $I$  و  $x_0 \in I$  تكون

النقطة  $M(x_0, f(x_0))$  نقطة انعطاف إذا وفقط إذا كان  $f''$  تتقدم وتغير

إشارة في  $x_0$  .

ملاحظة إذا كانت  $f'$  تتقدم ولا تتغير الإشارة في  $x_0$  فإن  $M(x_0, f(x_0))$  نقطة انعطاف ويكون المماس فيها موازيا لمحور الأفاصيل .

(b) إذا أردنا تحديد جميع نقط انعطاف او دراسة التفرع نحسب  $f''(x)$  وندرس إشارتها .

### (3) الفروع اللانهائية .

#### (a) تعريف

نقول إن  $C_f$  يقبل فرعا لانهايا إذا كانت لدينا إحدى الحالات التالية :

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$  أو  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$  أو  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  .

#### (b) تصنيف الفروع اللانهائية :

(1) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

فإن المستقيم  $x=a$  :  $\Delta$  ) مقارب لـ  $C_f$  بجوار  $a$  .

(2) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$

فإن المستقيم  $y=a$  :  $\Delta$  ) مقارب لـ  $C_f$  بجوار  $\infty$  .

(3) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  نقوم بحساب  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$  .

(a) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$

فإن  $C_f$  يقبل فرعا شلجيميا اتجاهه محور الأرتيب بجوار  $\infty$  .

(b) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

فإن  $C_f$  يقبل فرعا شلجيميا اتجاهه محور الأفاصيل بجوار  $\infty$  .

(c) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$  نقوم بحساب  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$  .

(i) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = b$

فإن المستقيم  $y = ax + b$  :  $\Delta$  ) مقارب لـ  $C_f$  بجوار  $\infty$  .

(ii) إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \infty$

فإن  $C_f$  يقبل فرعا شلجيميا اتجاهه  $y = ax$  بجوار  $\infty$  .

#### ملاحظة

يكون المستقيم  $y = ax + b$  :  $\Delta$  ) مقاربا لـ  $C_f$  بجوار

$\infty$  إذا وفقط إذا كان  $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$  ونستعمل

هذه الخاصية إذا كان السؤال هو بين أن  $y = ax + b$  :  $\Delta$  ) مقاربا لـ

$C_f$  أو إذا كانت  $f(x)$  على شكل  $f(x) = ax + b + h(x)$  مع

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 0$$

### (4) محور تماثل - مركز تماثل

(a) يكون المستقيم  $x = a$  :  $\Delta$  ) محور تماثل  $C_f$  إذا وفقط إذا كان :

(\* لكل  $x$  من  $D_f$  لدينا  $2a - x \in D_f$

(\*  $(\forall x \in D_f) : f(2a - x) = f(x)$

(b) تكون النقطة  $\Omega(a, b)$  مركز تماثل  $C_f$  إذا وفقط إذا كان :

(\* لكل  $x$  من  $D_f$  لدينا  $2a - x \in D_f$

(\*  $(\forall x \in D_f) : f(2a - x) = 2b - f(x)$

### (III) الدوال الدورية

#### (1) تعريف

(a) نقول إن الدالة  $f$  دورية إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي غير منعدم  $T$

بحيث  $(\forall x \in D_f) : f(x + T) = f(x)$  وكل عدد  $T$  يحقق هذا الشرط

يسمى دور  $f$

(b) إذا كان  $T$  دورا للدالة  $f$  فإن كل عدد  $kT$  دور لـ  $f$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )

(c) نختار عادة أصغر دور موجب قطعاً .

ملاحظة (a) لكي نبين أن  $f$  دورية يجب أولاً ملاحظة الدور ثم نتحقق منه

(b)  $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$  (\*)  $\cos(x + \pi) = -\cos x$  (\*)

(\*)  $\sin(x + k\pi) = \sin x$  (\*)  $\sin(x + \pi) = -\sin x$  (\*)

(\*)  $\tan(x + k\pi) = \tan x$  (\*)

#### (2) ادوار بعض الدوال الإعتيادية .

(a)  $f(x) = \sin(ax + b)$  أو  $f(x) = \cos(ax + b)$   $T = \frac{2\pi}{|a|}$

(b)  $f(x) = \sin^2(ax + b)$  أو  $f(x) = \cos^2(ax + b)$   $T = \frac{\pi}{|a|}$

(c)  $f(x) = \tan(ax + b)$   $T = \frac{\pi}{|a|}$

(d) لكي نحدد دور  $f + g$  نحدد أدوار كل من  $f$  و  $g$  و نأخذ أصغر دور مشترك .

#### (3) رتبة دالة دورية .

لتكن  $f$  دالة دورية دورها  $T$  . إذا كانت  $f$  رتيبة على  $[a, b]$  فإن

$f$  رتيبة على  $[a + T, b + T]$  ولها نفس الرتبة .

#### (4) منحنى دالة دورية

(a) إذا كانت  $f$  دالة دورية دورها  $T$  فيكفي إنشاء  $C_f$  على مجال سعته  $T$

(عادت نأخذ  $[0, T] \cap D_f$ ) ثم إزاحته بإلزاحة التي متجهتها  $T\vec{i}$

ومن أجل إزاحة هذا الجزئ نبحث عن النقط المهمة التي تكونه ونزيحها

بإضافة  $T$  إلى أفصولها والإحتفاظ بالرتوب إذا أردنا الإزاحة نحو اليمين

ونطرح  $T$  من الأفصول إذا أردنا الإزاحة نحو اليسار .

(b) إذا كانت  $f$  دالة دورية دورها  $T$  وزوجية (أو فردية) فيكفي إنشاء

$C_f$  على  $[0, \frac{T}{2}] \cap D_f$  ثم إنشاء المماثل بالنسبة لمحور الأرتيب (او أصل

المعلم) ثم الإزاحة .