

| سلسلة 4 | النهايات والاتصال | السنة 2 بكالوريا علوم رياضية |
|---|-------------------|------------------------------|
| <p>تمرين 1 : نعتبر الدالة المعرفة كما يلي : $f(x) = (\sqrt{x+1}-1)^3$</p> <p>1- حدد D_f حيز تعريف الدالة</p> <p>2- ادرس رتابة الدالة f على حيز تعريفها باستعمال التعريف.</p> <p>3- بين أن f تقابل من D_f نحو مجال J يجب تحديده.</p> <p>4- احسب $f^{-1}(x)$ لكل x من J</p> | | |
| <p>تمرين 2 : نعتبر الدالة المعرفة كما يلي : $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$</p> <p>1- بين أن : $f(x) = \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}}$: $\forall x \in]-1; +\infty[$</p> <p>2- بين أن f تقابل من IR^+ نحو مجال J يجب تحديده.</p> <p>3- احسب $f^{-1}(x)$ لكل x من J</p> | | |
| <p>تمرين 3 : احسب النهايات التالية :</p> $\lim_{x \rightarrow -2^-} \left(\frac{\sqrt[3]{x^2 - 4}}{x + 2} \right) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt[3]{x+1}-1}{x} \right) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{8x^3 - x + 1} - x \right)$ | | |
| <p>تمرين 4 : أثبت المتساويات التالية :</p> $\forall x < 0 \quad \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2} \quad , \quad \text{Arctan}\left(\frac{3}{4}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{\pi}{2} \quad , \quad \text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\pi}{4}$ | | |
| <p>تمرين 5 : حل في IR المعادلتين :</p> $\text{Arctan}(2x) + \text{Arctan}(3x) = \frac{\pi}{4} \quad , \quad \text{Arctan}\left(\frac{1}{2x-1}\right) + \text{Arctan}(x) = \frac{\pi}{2}$ | | |
| <p>تمرين 6 : احسب النهاية التالية : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\text{Arctg}(2x) - \text{Arctg}(x))$</p> | | |

| سلسلة 4 | النهايات والاتصال حل مقترح | السنة 2 بكالوريا علوم رياضية |
|--|--|------------------------------|
| تمرين 1: $f(x) = (\sqrt{x+1}-1)^3$ | | |
| | لدينا : $x \in D_f \Leftrightarrow x+1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$ منه : $D_f = [-1; +\infty[$ | 1 |
| | $x > y \Rightarrow x+1 > y+1 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} > \sqrt{y+1}$ $\Rightarrow \sqrt{x+1}-1 > \sqrt{y+1}-1 \Rightarrow (\sqrt{x+1}-1)^3 > (\sqrt{y+1}-1)^3$: لدينا ، $(x,y) \in [-1; +\infty[^2$ ليكن $x > y \Rightarrow f(x) > f(y)$ <p style="text-align: right;">إذن f تزايدية قطعاً على D_f</p> | 2 |
| | <p style="text-align: center;">بما أن f متصلة و تزايدية قطعاً على D_f</p> <p style="text-align: center;">فهي تقابل من D_f نحو $J = f([-1; +\infty[) = [f(-1); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)] = [-1; +\infty[$</p> | 3 |
| | <p>ليكن $x \in [-1; +\infty[$ و $y \in [-1; +\infty[$: لدينا ، $f^{-1}(x) = y \Rightarrow f(y) = x \Rightarrow (\sqrt{y+1}-1)^3 = x$</p> <p>$f^{-1}(x) = y \Rightarrow \sqrt{y+1}-1 = \sqrt[3]{x} \Rightarrow \sqrt{y+1} = \sqrt[3]{x}+1$</p> <p>$\Rightarrow y+1 = (\sqrt[3]{x}+1)^2 \Rightarrow y = (\sqrt[3]{x}+1)^2 - 1 = \sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x}$: فإن $x \in [0; +\infty[$ إذا كان</p> <p>$\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x}$</p> <p>$f^{-1}(x) = y \Rightarrow (1-\sqrt{y+1})^3 = -x$</p> <p>$\Rightarrow 1-\sqrt{y+1} = \sqrt[3]{-x} \Rightarrow \sqrt{y+1} = 1-\sqrt[3]{-x}$</p> <p>$\Rightarrow y+1 = (1-\sqrt[3]{-x})^2 \Rightarrow y = (1-\sqrt[3]{-x})^2 - 1 = \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{-x}$</p> <p>$\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{-x}$</p> <p style="text-align: right;">بالتالي:</p> $\begin{cases} f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{-x} ; x \in [-1; 0[\\ f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} ; x \in [0; +\infty[\end{cases}$ | 4 |
| <p>يبدو سؤالاً سهلاً في البداية، إذ أن عدم الانتباه أن دالة الجذر المكعب معرفة على $[0; +\infty[$ سيجعلنا نتسرع في تحديد صيغة الدالة العكسية دون مراعاة مجال التعريف.</p> | | |
| تمرين 2: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ | | |
| | $\forall x \in]-1; +\infty[: \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} = \frac{x+1-1}{\sqrt{x+1}} = \frac{x}{\sqrt{1+x}} = f(x)$: لدينا | 1 |
| | $x > y \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{x+1} > \sqrt{y+1} > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{x+1}} < \frac{1}{\sqrt{y+1}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{x+1} > \sqrt{y+1} > 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{x+1}} > -\frac{1}{\sqrt{y+1}} \end{cases}$ $\Rightarrow \sqrt{x+1} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} > \sqrt{y+1} - \frac{1}{\sqrt{y+1}}$: لدينا ، $(x,y) \in [0; +\infty[^2$ ليكن $x > y \Rightarrow f(x) > f(y)$ <p style="text-align: right;">إذن f تزايدية قطعاً على $[0; +\infty[$ ، وبما أنها متصلة عليه</p> <p style="text-align: center;">فهي إذن تقابل من $[0; +\infty[$ نحو $J = f([0; +\infty[) = [f(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)] = [0; +\infty[$</p> | 2 |

$$f^{-1}(x) = y \Rightarrow f(y) = x \Rightarrow \frac{y}{\sqrt{1+y}} = x$$

ليكن $x \in [0; +\infty[$ و $y \in [0; +\infty[$ ، لدينا :

$$\Rightarrow y^2 = x^2(y+1) \Rightarrow y^2 - x^2y - x^2 = 0$$

محددة الحدودية $y^2 - x^2y - x^2 = 0$ ذات المجهول y هي : $\Delta = x^4 + 4x^2 \geq 0$

$$f^{-1}(x) = y \Rightarrow y = \frac{x^2 + \sqrt{x^4 + x^2}}{2} \text{ ou } y = \frac{x^2 - \sqrt{x^4 + x^2}}{2} : \text{ إذن}$$

$$\forall x \in [0; +\infty[\quad f^{-1}(x) = \frac{x^2 + \sqrt{x^4 + x^2}}{2} : \text{ فإن } \forall x \in [0; +\infty[\quad \frac{x^2 + \sqrt{x^4 + x^2}}{2} \geq 0$$

3

لنا مظهرين للبرهان ان $\frac{x^2 - \sqrt{x^4 + x^2}}{2} \notin [0; +\infty[$ و السبب أننا نعلم مسبقا عن طريق الاتصال

والرتابة وحدانية تعبير الدالة العكسية، لذلك أي تعبير سنجده يحقق الشروط سيكون تلقائيا هو التعبير المبحوث عنه والوحيد. لكننا في السنة الأولى بكالوريا لم نكن نكتفي بهذا الأمر والسبب أننا لم نكن نتوفر على خاصية تسمح مسبقا بضمان وجود الدالة العكسية.

تمرين 3: احسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{8x^3 - x + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 \left(8 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt[3]{8 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} - 1 \right) = +\infty$$

($+\infty \times (2-1)$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1-1}{x \left((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \left(\frac{\sqrt[3]{x^2 - 4}}{x+2} \right) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{\sqrt[3]{x^2 - 4}}{-(-x-2)} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{\sqrt[3]{x^2 - 4}}{-\sqrt[3]{(-x-2)^3}} = \lim_{x \rightarrow -2^-} -\sqrt[3]{\frac{(x-2)(x+2)}{-(x+2)^3}} = \lim_{x \rightarrow -2^-} -\sqrt[3]{\frac{2-x}{(x+2)^2}} = -\infty$$

استعمال الخاصية $\sqrt[3]{a \times b} = \sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b}$ ممكن لكن به مخاطرة حيث يجب أن يكون a و b موجبين، لكن

$$x^2 - 4 = (x+2)(x-2) \text{ هو جداء عددين سالبين، لذلك يتوجب كتابتهما على شكل } x^2 - 4 = (-x-2)(-x+2)$$

تمرين 4: أثبت المتساويات التالية :

$$a = \text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{2}{3}\right) : \text{ نضع ، } \text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{cases} 0 < \frac{1}{5} < 1 \\ 0 < \frac{2}{3} < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < \text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right) < \frac{\pi}{4} \\ 0 < \text{Arctan}\left(\frac{2}{3}\right) < \frac{\pi}{4} \end{cases} \Rightarrow 0 < a < \frac{\pi}{2} \text{ ، لدينا}$$

$$\left[\left(a, \frac{\pi}{4} \right) \in \right] \frac{-\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \left[\Rightarrow a = \frac{\pi}{4} : \text{ إذن ، } \tan(a) = \frac{\tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right)\right) + \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{2}{3}\right)\right)}{1 - \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{5}\right)\right) \cdot \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{2}{3}\right)\right)} = \frac{\frac{1}{5} + \frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{15}} = \frac{\frac{13}{15}}{\frac{13}{15}} = 1$$

لاحظ جيدا شروط البرهان على المتساوية، فلا يكفي البرهان أن $\tan(a) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ بل يجب البرهان قبل ذلك أنهما

ينتميان معا لمجال من الشكل : $\left] \frac{-\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$ حيث تكون فيه دالة قوس الظل تقابلا.

$$\text{Arctan}\left(\frac{3}{4}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{\pi}{2} : \text{لنبين أن}$$

$$\text{Arctan}\left(\frac{3}{4}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \text{Arctan}\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) : \text{لدينا}$$

$$b = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) \text{ و } a = \text{Arctan}\left(\frac{3}{4}\right) : \text{نضع}$$

$$\frac{4}{3} > 0 \Rightarrow 0 < \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) < \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} < -\text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) < 0 \Rightarrow 0 < \frac{\pi}{2} - \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) < \frac{\pi}{2} : \text{لدينا}$$

$$0 < \text{Arctan}\left(\frac{3}{4}\right) < \frac{\pi}{2} : \text{و أيضا}$$

$$\tan(b) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right)\right) = \frac{1}{\tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right)\right)} = \frac{1}{\frac{4}{3}} = \frac{3}{4} = \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{3}{4}\right)\right) : \text{ولدينا}$$

$$\text{إذن : } a = b \Rightarrow \left. \begin{array}{l} (a, b) \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\\ \tan(a) = \tan(b) \end{array} \right\} \text{ ، وهذا ينهي البرهان}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad -\frac{\pi}{2} < \text{Arctan } x < \frac{\pi}{2} : \text{لأننا نعلم مسبقا أن} \quad \frac{4}{3}$$

$$\forall x < 0 \quad \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{-\pi}{2} : \text{لنبين أن}$$

$$\text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{-\pi}{2} \Leftrightarrow \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{-\pi}{2} - \text{Arctan}(x) : \text{لدينا}$$

$$b = \frac{-\pi}{2} - \text{Arctan}(x) \text{ و } a = \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) : \text{نضع}$$

$$x < 0 \Rightarrow \frac{-\pi}{2} < \text{Arctan}(x) < 0 \Rightarrow 0 < -\text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) < \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} < \frac{-\pi}{2} - \text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right) < 0 : \text{لدينا}$$

$$\text{و أيضا : } -\frac{\pi}{2} < \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) < 0 \text{ ، ولدينا}$$

$$\tan(b) = \tan\left(\frac{-\pi}{2} - \text{Arctan}(x)\right) = \tan\left(\frac{-\pi}{2} + \pi - \text{Arctan}(x)\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan}(x)\right) = \frac{1}{\tan(\text{Arctan}(x))} = \frac{1}{x}$$

$$\text{إذن : } a = b \Rightarrow \left. \begin{array}{l} (a, b) \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\\ \tan(a) = \tan(b) \end{array} \right\} \text{ ، وهذا ينهي البرهان}$$

$$\tan(x) = \tan(x + k\pi) / k \in \mathbb{Z} : \text{استعملنا الخاصية}$$

تمرين 5 :

$$D = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\} : \text{مجموعة صلاحيتها هي} \quad (E) : \text{Arctan}\left(\frac{1}{2x-1}\right) + \text{Arctan}(x) = \frac{\pi}{2}$$

$$(E) \Rightarrow \text{Arctan}\left(\frac{1}{2x-1}\right) = \frac{\pi}{2} - \text{Arctan}(x) \Rightarrow \tan\left(\text{Arctan}\left(\frac{1}{2x-1}\right)\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \text{Arctan}(x)\right) : \text{لدينا}$$

$$(E) \Rightarrow \frac{1}{2x-1} = \frac{1}{\tan(\text{Arctan}(x))} = \frac{1}{x} \Rightarrow 2x-1 = x \Rightarrow x = 1$$

عكسيا يمكن التحقق بسهولة من أن 1 حل لهذه المعادلة ، بالتالي : $S = \{1\}$

ليس من الضروري البرهان أن $\frac{\pi}{2} - \text{Arctan}(x) \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$ والسبب أنه من خلال المعادلة التي هي معطاة يساوي تعبيرنا نعلم

مسبقا أنه ينتمي لهذا المجال، فالأمر مختلف عن التمرين السابق لأننا لسنا بصدد البرهان على هذه المتساوية، بل نستعملها و نقوم باستنتاجات.

$$\begin{aligned} \text{Arctan}(2x) + \text{Arctan}(3x) = \frac{\pi}{4} &\Rightarrow \tan(\text{Arctan}(2x) + \text{Arctan}(3x)) = 1 \\ &\Rightarrow \frac{2x + 3x}{1 - 6x^2} = 1 \Rightarrow 5x = 1 - 6x^2 \\ &\Rightarrow 6x^2 + 5x - 1 = 0 \\ &\Rightarrow x = -1 \text{ ou } x = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

عكسيا نتحقق أن $\frac{1}{6}$ هو العدد الوحيد الذي يحقق هذه المعادلة (لأن: $\text{Arctan}(-2) + \text{Arctan}(-3) < 0$ و

$$\text{Arctan}\left(\frac{1}{3}\right) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$S = \left\{ \frac{1}{6} \right\} \text{ : خلاصة}$$

استعملنا المحددة لتحديد حلول المعادلة $6x^2 + 5x - 1 = 0$

تمرين 6: لنحسب النهاية التالية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\text{Arctg}(2x) - \text{Arctg}(x))$

نضع: $t = \frac{1}{x}$ ، إذن:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\text{Arctan}(2x) - \text{Arctan}(x)) &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\text{Arctan}\left(\frac{2}{t}\right) - \text{Arctan}\left(\frac{1}{t}\right)}{t} = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\frac{\pi}{2} - \text{Arctan}\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{\pi}{2} + \text{Arctan}(t)}{t} \\ &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\text{Arctan}(t) - \text{Arctan}\left(\frac{t}{2}\right)}{t} = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\text{Arctan}(t)}{t} - \frac{\text{Arctan}\left(\frac{t}{2}\right)}{t} \\ &= \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{\text{Arctan}(t)}{t} - \frac{1}{2} \frac{\text{Arctan}\left(\frac{t}{2}\right)}{\frac{t}{2}} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

استعملنا المتساوية: $\forall x > 0 \quad \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$ والتي يمكن استعمالها في حال لم تكن كسؤال

فرعي مساعد، وأيضا النهاية الهامة: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{Arctan}(x)}{x} = 1$ والتي يمكن البرهان عنها بسهولة باستعمال تغيير المتغير

$$\text{Arctan}(x) = t$$