

تمرين 1 : حدد مجموعة تعريف الدوال التالية :

$$p(x) = \frac{3}{1 - \ln(x)} , \quad h(x) = \ln(5 - x) + \ln(x^2 - 3) , \quad g(x) = \ln(x^2 - 2x + 5) , \quad f(x) = \ln(x^2 + 2x)$$

تمرين 2 :

$$\ln(x^2 + 1) = 1 \quad \text{و} \quad \ln(x^2 - 3) = \ln(2x) \quad \text{و} \quad \ln(x^2 + 2x) = 0$$

$$\ln(x+1) \geq \ln(2x) \quad \text{حل في } IR \text{ المترابحة :}$$

تمرين 3 :

$$1) \text{ احسب : } \ln(\sqrt{\sqrt{2} + 1}) + \ln(\sqrt{\sqrt{2} - 1})$$

$$2) \text{ حدد قيمة مقربة لـ كل من : } \ln(3) \cong 1,1 \quad \ln(2) \cong 0,7 \quad \ln(\sqrt[3]{12}) \text{ و } \ln\left(\frac{16}{9}\right) \text{ و } \ln(\sqrt{6})$$

تمرين 4 : حدد $f'(x)$ في كل حالة مما يلي دون تحديد مجموعة التعريف :

$$f(x) = x \ln(x) + \frac{\ln(\sqrt{x})}{x} , \quad f(x) = \ln^3(x) , \quad f(x) = \ln(1 + \ln(x)) , \quad f(x) = \ln(7 - x^2) , \quad f(x) = \ln(2x + 1)$$

تمرين 5 : احسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} + \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} + \ln\left(\frac{x^2 + 5}{x^2 + 1}\right) , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x) + \frac{1}{\ln(x)} \quad 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^2(x) - x , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2)}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x) + \sqrt{x} \ln(x) , \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) - x , \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} + \ln\left(\frac{x^2 + 5}{x^2 + 1}\right) , \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(2x) + \frac{1}{\ln(x)} \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) \ln(x+1) , \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x) - \ln(2)}{x - 2}$$

تمرين 6 : احسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x-3} \ln\left(\frac{x}{3}\right) , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x+3) - \ln(x+5) , \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{\ln(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{\ln(x)} - \sqrt[3]{x} , \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x - \ln(x)}{2 + \ln(x)} , \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x^3 + 7x)$$

تمرين 1 : لنحدد مجموعة تعريف الدوال التالية :

$$Df = \{x \in IR / x^2 + 2x > 0\} = \{x \in IR / x(x+2) > 0\} =]-\infty; -2] \cup [0; +\infty[\quad f(x) = \ln(x^2 + 2x)$$

$$Dg = \{x \in IR / x^2 - 2x + 5 > 0\} = IR \quad \Delta = 4 - 20 < 0 \quad \text{لأن: } g(x) = \ln(x^2 - 2x + 5)$$

$$\begin{aligned} Dh &= \{x \in IR / 5 - x > 0 \text{ et } x^2 - 3 > 0\} = \{x \in IR / 5 - x > 0 \text{ et } x^2 > 3\} \\ &= \{x \in IR / x < 5 \text{ et } (x > \sqrt{3} \text{ ou } x < -\sqrt{3})\} \\ &= \{x \in IR / (x < 5 \text{ et } x > \sqrt{3}) \text{ ou } (x < 5 \text{ et } x < -\sqrt{3})\} \end{aligned} \quad h(x) = \ln(5 - x) + \ln(x^2 - 3)$$

$$Dh = [\sqrt{3}; 5] \cup]-\infty; -\sqrt{3}[=]-\infty; -\sqrt{3}[\cup [\sqrt{3}; 5[$$

$$\begin{aligned} Dp &= \{x \in IR / x > 0 \text{ et } 1 - \ln x \neq 0\} = \{x \in IR / x > 0 \text{ et } \ln x \neq 1\} \\ &= \{x \in IR / x > 0 \text{ et } \ln x \neq \ln e\} = \{x \in IR / x > 0 \text{ et } x \neq e\} \end{aligned}$$

$$Dp =]0; e \cup]e; +\infty[\quad p(x) = \frac{3}{1 - \ln(x)}$$

تمرين 2 :

مجموعة صلاحية المعادلة هي : $D =]-\infty; -2] \cup [0; +\infty[$

الآن : $\ln(x^2 + 2x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x^2 + 2x) = \ln 1 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 1 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 1 = 0$

بعد حساب المحدد Δ نجد :

$$\begin{aligned} \Delta = 4 + 4 &= 8 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-2 + \sqrt{8}}{2} = \frac{-2 + 2\sqrt{2}}{2} = -1 + \sqrt{2} \approx 0,41 \in D \\ x_2 = \frac{-2 - \sqrt{8}}{2} = \frac{-2 - 2\sqrt{2}}{2} = -1 - \sqrt{2} \approx -2,41 \in D \end{cases} \\ S &= \boxed{-1 + \sqrt{2} ; -1 - \sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\ln(x^2 + 2x) = 0$$

قبل إنجاز المعادلات أو المترابحات يجب تحديد مجموعة صلاحية المعادلة وبعد إيجاد الحلول يجب

التحقق من الحلول التي تنتمي لمجموعة الصلاحية ، طريقة الجواب أعلاه تمثل اختصاراً لهذه

الطريقة باستعمال الرموز الرياضية ، وقد استعملنا خلالها نتيجة 1 من التمارين السابق. أخيراً

استعملنا تقريباً للحلول لنستطيع أن نحدد الحلول التي تنتمي لمجموعة لصلاحية المعادلة

$\boxed{[0, +\infty[}$ (وجدنا كلاً الحللين ينتمي لمجموعة الصلاحية)

$$D = \{x \in IR / x^2 - 3 > 0 \text{ et } 2x > 0\} = \{x \in IR / x^2 > 3 \text{ et } x > 0\}$$

$$D = \{x \in IR / x > \sqrt{3}\} = [\sqrt{3}; +\infty[$$

$$\ln(x^2 - 3) = \ln(2x) \Leftrightarrow x^2 - 3 = 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$S = \boxed{\{3\}} \quad \text{بالتالي : } \Delta = 4 + 12 = 16 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2+4}{2} = 3 \in D \\ x_2 = \frac{2-4}{2} = -1 \notin D \end{cases}$$

$$\ln(x^2 - 3) = \ln(2x)$$

$$D = \{x \in IR / x^2 + 3 > 0\} = IR$$

$$\ln(x^2 + 1) = 1 \Leftrightarrow \ln(x^2 + 1) = \ln(e) \Leftrightarrow x^2 + 1 = e$$

$$S = \boxed{\{\sqrt{e-1}, -\sqrt{e-1}\}} \quad \text{بالتالي : } \ln(x^2 + 1) = 1 \Leftrightarrow x^2 = e - 1$$

$$\ln(x^2 + 1) = 1$$

$$\ln(x^2 + 1) = 1 \Leftrightarrow x = \sqrt{e-1} \text{ ou } x = -\sqrt{e-1}$$

$$D = \{x \in IR / x+1 > 0 \text{ et } 2x > 0\} = \{x \in IR / x > -1 \text{ et } x > 0\} =]0; +\infty[$$

$$\ln(x+1) \geq \ln(2x) \Leftrightarrow x+1 \geq 2x \Leftrightarrow x-2x \geq -1 \Leftrightarrow -x \geq -1 \Leftrightarrow x \leq 1$$

بال التالي :

تمرين 3 :

$$\ln(\sqrt{\sqrt{2}+1}) + \ln(\sqrt{\sqrt{2}-1}) = \ln(\sqrt{\sqrt{2}+1} \times \sqrt{\sqrt{2}-1}) = \ln(\sqrt{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}) = \ln(\sqrt{2-1}) = \ln(1) = 0$$

استعملنا الخاصية :

1

$$\ln(\sqrt{6}) = \frac{1}{2} \ln(6) = \frac{1}{2} (\ln(2) + \ln(3)) \approx \frac{0,7+1,1}{2} \approx 0,9$$

$$\ln\left(\frac{16}{9}\right) = \ln(16) - \ln(9) = \ln(2^4) - \ln(3^2) = 4\ln(2) - 2\ln(3) \approx 4 \times 0,7 - 2 \times 1,1 \approx 2,8 - 2,2 \approx 0,6$$

$$\ln(\sqrt[3]{12}) = \frac{1}{3} \ln(12) = \frac{1}{3} \ln(2^2 \times 3) = \frac{2\ln(2) + \ln(3)}{3} \approx \frac{1,4+1,1}{3} \approx \frac{2,5}{3} \approx 0,8$$

استعملنا الخاصيات :

2

تمرين 4 :

$$f(x) = \ln(1 + \ln(x))$$

$$f(x) = \ln(7 - x^2)$$

$$f(x) = \ln(2x+1)$$

$$f'(x) = \frac{(1 + \ln(x))'}{1 + \ln(x)} = \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{(7 - x^2)'}{7 - x^2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x+1)'}{2x+1}$$

$$f'(x) = \frac{-2x}{7 - x^2}$$

$$f'(x) = \frac{2}{2x+1}$$

$$f(x) = x \ln(x) + \frac{\ln(\sqrt{x})}{x}$$

$$f(x) = \ln^3(x)$$

$$f'(x) = (x \ln(x))' + \left(\frac{1}{2} \frac{\ln(x)}{x}\right)'$$

$$f'(x) = 3(\ln^2(x))(\ln(x))'$$

$$f'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{x} \times x - 1 \times \ln(x)}{x^2}$$

$$f'(x) = 3 \ln^2(x) \times \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \ln(x) + 1 + \frac{1 - \ln(x)}{2x^2}$$

من المستحسن استعمال خصائص دالة اللوغاريتم قبل الاشتقاق

$$\ln(u(x))' = \frac{(u(x))'}{u(x)} : \text{ للتذكير}$$

تمرين 5 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} + \ln\left(\frac{x^2 + 5}{x^2 + 1}\right) = 0 + \ln(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x) + \frac{1}{\ln(x)} = +\infty$$

$$(+\infty + 0 \rightarrow +\infty)$$

1

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 5}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 : \text{ لأن}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} + \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} = 0 + 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) = -\infty$$

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \text{ , } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^r} = 0 \quad r > 0 \quad \text{لأن: لكل}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} - 1 = 0 - 1 = -1 : \text{لأن}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\ln(x)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x+2} \times \frac{\ln(x)}{x} = 2 \times 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^2(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\ln^2(x)}{x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\left[\frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} \right]^2 - 1 \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(2x) + \frac{1}{\ln(x)} = -\infty (-\infty + 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty \quad (\frac{-\infty}{0^+} \rightarrow -\infty) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x^2 + 5}{x^2 + 1}\right) = \ln(5) : \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} + \ln\left(\frac{x^2 + 5}{x^2 + 1}\right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0 : \text{باستعمال النهاية الخاصة} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) - x = 0 - 0 = 0$$

2

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln(x) + \sqrt{x} \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \times [x \ln(x)] + \sqrt{x} \ln(\sqrt{x^2}) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \times [x \ln(x)] + 2\sqrt{x} \ln(\sqrt{x}) = 0 \times 0 + 2 \times 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) \ln(x+1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) \frac{\ln(x+1)}{x} = 0 \times 1 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x) - \ln(2)}{x-2} = \ln'(2) = \frac{1}{2}$$

تمرين 6 :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{\ln(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)\right)}{\ln(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2) + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{\ln(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{\ln(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{\ln(x)} = 2 \quad \left(\frac{0}{+\infty} \rightarrow 0 \right) \end{aligned}$$

$$(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+3}{x+5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = 2 : \text{لأن}) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x+3) - \ln(x+5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+3}{x+5}\right) = \ln(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x-3} \ln\left(\frac{x}{3}\right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x-3} (\ln(x) - \ln(3)) = \lim_{x \rightarrow 3} x \frac{\ln(x) - \ln(3)}{x-3} = 3 \times \ln'(3) = 3 \times \frac{1}{3} = 1$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x>0}} x \ln(x^3 + 7x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x>0}} x \ln(x(x^2 + 7)) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x>0}} x \ln(x) + x \ln(x^2 + 7) = 0 + 0 \times \ln(7) = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x>0}} \frac{x - \ln(x)}{2 + \ln(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x>0}} \frac{x + 2 - 2 - \ln(x)}{2 + \ln(x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x>0}} \frac{x + 2}{2 + \ln(x)} - 1 = 0 - 1 = -1 \quad \left(\frac{2}{-\infty} \rightarrow 0 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{\ln(x)} - \sqrt[3]{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \left(\sqrt[3]{\frac{\ln(x)}{x}} - 1 \right) = -\infty$$

لاحظ من خلال هذه الأمثلة أنه لا توجد طريقة محددة للتعامل مع نهايات دالة اللوغاريتم، عليكِ محاولة استثمار الأفكار من كل نهاية