

فضاءات المتجهية الحقيقية

1 - تعريف وأمثلة :
1 - قانون تركيب خارجي :

a - تعريف :

لتكن A و E مجموعتين غير فارغتين كل تطبيق f من $A \times E$ نحو E يسمى قانون تركيب خارجي معرف على E ذو المعاملات في A بتعبير آخر :

$$f : A \times E \rightarrow E \\ (\alpha, x) \rightarrow f(\alpha, x) \Leftrightarrow \text{قانون تركيب خارجي معرف على } E \text{ ذو المعاملات في } A$$

يرمز عادة للصورة $f(\alpha, x)$ بالرمز $\alpha \cdot x$ أو

b - أمثلة :

1 - لكل α من IR و M من $M_2(IR)$ لدينا : $M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ حيث $M_2(IR)$ حيث

إذن : التطبيق $f : IR \times M_2(IR) \rightarrow M_2(IR)$ و معاملاته في $M_2(IR)$ قانون تركيب خارجي معرف على $(\alpha, M) \rightarrow \alpha M$

2 - لكل α من IR و f من $F(I, IR)$ مجموعة الدوال العددية المعرفة على مجال I ضمن IR نحو f لدينا : $\alpha f \in F(I, IR)$

إذن : التطبيق $g : IR \times F(I, IR) \rightarrow F(I, IR)$ و معاملاته في $F(I, IR)$ قانون تركيب خارجي معرف على $(\alpha, f) \rightarrow \alpha f$

2 - تعريف الفضاء المتجهي :

a - تعريف :

لتكن E مجموعة مزودة بقانون تركيب داخلي $*$ و بقانون تركيب خارجي معاملاته في IR $(\alpha, x) \rightarrow \alpha \cdot x$

نقول أن : $(E, *, \cdot)$ فضاء متجهي على IR أو فضاء متجهي حقيقي إذا وفقط إذا تحققت الشروط التالية :
 - 1 زمرة تبادلية $(E, *)$

$$(\forall (\alpha, \beta) \in IR^2)(\forall x \in E) \quad (\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x \quad - 2$$

$$(\forall (\alpha, \beta) \in IR^2)(\forall x \in E) \quad (\alpha \beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x) \quad - 3$$

$$(\forall \alpha \in IR)(\forall (x, y) \in E^2) \quad \alpha \cdot (x * y) = \alpha \cdot x * \alpha \cdot y \quad - 4$$

$$(\forall x \in E) \quad 1 \cdot x = x \quad -5$$

في ما تبقى من هذا الدرس نرمز للقانون الداخلي * بالرمز + و لكل عنصر x من E بالرمز \vec{x} و نسميه متجهة منه التعريف التالي للفضاء المتجهي $(E, +, \times)$

نقول أن : $(E, +, \times)$ فضاء متجهي على IR أو فضاء متجهي حقيقي إذا و فقط إذا تحققت الشروط التالية :

$(E, +)$ زمرة تبادلية - 1

$$(\forall (\alpha, \beta) \in IR^2)(\forall \vec{x} \in E) \quad (\alpha + \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{y} \quad -2$$

$$(\forall (\alpha, \beta) \in IR^2)(\forall \vec{x} \in E) \quad (\alpha\beta)\vec{x} = \alpha(\beta\vec{x}) \quad -3$$

$$(\forall \alpha \in IR)(\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2) \quad \alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y} \quad -4$$

$$(\forall x \in E) \quad 1 \cdot \vec{x} = \vec{x} \quad -5$$

b - قواعد الحساب في فضاء متجهي :

ليكن $(E, +, \times)$ فضاء متجهي حقيقي لدينا الخصائص التالية

$\vec{a} + \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{b} + (-\vec{a})$	1
المتجهة $\vec{b} + (-\vec{a})$ تسمى فرق المتجهتين \vec{a} و \vec{b} وتكتب كذلك $\vec{a} - \vec{b}$	
$(\alpha \in IR)(\forall x \in E) \quad \alpha\vec{x} = \vec{0} \Leftrightarrow \alpha = 0 \quad \vec{x} = \vec{0}$ أو	2
$(\alpha \in IR)(\forall x \in E) \quad (-\alpha)\vec{x} = \alpha(-\vec{x}) = -(\alpha\vec{x})$	3
$(\alpha \in IR)(\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in E^2) \quad \alpha(\vec{y} - \vec{x}) = \alpha\vec{y} - \alpha\vec{x}$	4
$(\forall (\alpha, \beta) \in IR^2)(\forall \vec{x} \in E) \quad (\alpha - \beta)\vec{x} = \alpha\vec{x} - \beta\vec{y}$	5

c - أمثلة و تمارين تطبيقية : (أنظر سلسلة التمارين)

II - الفضاء المتجهي الجزئي :

1 - تعريف :

ليكن $(E, +, \times)$ فضاء متجهي حقيقي و F جزء غير فارغ من E

نقول أن F فضاء متجهي جزئي من الفضاء E إذا و فقط إذا تحقق ما يلي :

$$(\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in F^2) \quad \vec{x} + \vec{y} \in F \quad \text{أي : } F \text{ مستقر بالنسبة للقانون الداخلي} + \quad -1$$

$$(\forall \vec{x} \in F)(\forall \lambda \in IR) \quad \lambda\vec{x} \in F \quad \text{أي : } F \text{ مستقر بالنسبة للقانون الخارجي} \times \quad -2$$

بتعبير آخر :

$\begin{cases} F \neq \emptyset \\ F \subset E \\ (\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in F^2) \quad \vec{x} + \vec{y} \in F \\ (\forall \lambda \in IR)(\forall x \in F) \quad \lambda\vec{x} \in F \end{cases}$	\Leftrightarrow	فضاء متجهيا جزئيا من E
---	-------------------	--------------------------

2 - أمثلة :

$$(E, +, \times) \text{ و } E \text{ فضائي متجهيين جزئيين من الفضاء المتجهي } \{\vec{0}\} \quad 1$$

$$P_n \text{ مجموعة الحدوبيات التي درجتها أصغر من تساوي } n \text{ فضاء متجهي جزئي من الفضاء المتجهي} \quad 2$$

$(F(IR, IR), +, \times)$	
$(IR^2, +, \times)$ فضاء متجهي جزئي من الفضاء المتجهي $(x, y) \in IR^2 / y = 2x$ (تحقق من ذلك)	3

3 - الخاصية المميزة لفضاء متجهي جزئي:

ليكن $(E, +, \times)$ فضاء متجهي حقيقي و F جزء من

$\left\{ \begin{array}{l} F \neq \emptyset \\ (\forall(\lambda, \beta) \in IR^2)(\forall(\vec{x}, \vec{y}) \in F^2) \quad \beta\vec{x} + \lambda\vec{y} \in F \end{array} \right. \Leftrightarrow E$ فضاء متجهياً جزئياً من F

III - التأليفات الخطية :

1 - تعريف :

لتكن \vec{x}_1 و \dots و \vec{x}_n متجهات من الفضاء المتجهي E و α_1 و α_2 و \dots و α_n أعداداً حقيقية . المتجهة $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i$ تسمى تأليف خطية للمتجهات \vec{x}_1 و \vec{x}_2 و \dots و \vec{x}_n ذات المعاملات α_1 و α_2 و \dots و α_n . ونقول كذلك أن الأسرة $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ تولد المتجهة \vec{x} أو المتجهة \vec{x} مولدة بالأسرة $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ و نقول عن أسرة $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ أنها تولد الفضاء المتجهي E ! فقط إذا كانت كل متجهة \vec{x} من E تكتب على شكل تأليف خطية للمتجهات \vec{x}_1 و \vec{x}_2 و \dots و \vec{x}_n
--

بتعبير آخر:

$B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) \left(\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in IR^n \right) / \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i \Leftrightarrow \vec{x}$ مولدة بالأسرة B
--

$B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) \left(\forall \vec{x} \in E \right) \left(\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in IR^n \right) / \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{x}_i \Leftrightarrow E$ مولد بالأسرة B
--

2 - تمرين تطبيقي:

نعتبر المجموعة E المعرفة بالصيغة التالية :

1 - بين أن $(E, +, \cdot)$ فضاء متجهي حقيقي

2 - لتكن $(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = (0, 3, 1)$ و $(\vec{e}_2, \vec{e}_1) = (1, 1, 0)$ متجهتين من E

بين أن الأسرة $(E, +, \cdot)$ تولد الفضاء المتجهي (\vec{e}_1, \vec{e}_2)

3 - الارتباط والاستقلال الخطى:

a - تعريف

لتكن $(E, +, \cdot)$ أسرة من متجهات الفضاء المتجهي $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$

نقول أن:

الأسرة B مرتبطة خطياً أو مقيدة

$\Leftrightarrow \left(\exists (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in IR^n \right) / (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \neq (0, 0, \dots, 0) \text{ و } \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = o$
--

$$\left(\forall (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in IR^n ; \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0 \right) \Leftrightarrow \text{الأسرة } B \text{ مستقلة خطياً أو حرة}$$

b - مثال :

في الفضاء المتجهي $(M_2(IR), +, \cdot)$ نعتبر الأسرتين $B_2 = (L, J, K)$ و $B_1 = (L, J)$ بحيث :

$$K = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{و} \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2L + 3J = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = K \quad \text{لدينا :}$$

إذن : $2L + 3J - K = 0$
 $(2, 3, -1) \neq (0, 0, 0)$ مقيدة لأن : $2L + 3J - K = 0$ و منه أسرة $B_2 = (L, J, K)$ من جهة أخرى لدينا :

$$\alpha L + \beta J = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 2\alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2\beta \\ \beta & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha & 2\alpha \\ \beta & 2\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

إذن الأسرة $B_1 = (L, J)$ حرة

c - خصائص :

إذا كانت B أسرة مقيدة فإن كل أسرة تتضمن B تكون كذلك مقيدة
إذا كانت B أسرة ضمن أسرة حرة فإن B تكون كذلك حرة

بتعبير آخر :

$$\begin{array}{l} \text{أسرة مقيدة و } B' \Leftrightarrow B \subset B' \text{ أسرة مقيدة} \\ \text{أسرة حرة و } B' \Leftrightarrow B' \subset B \text{ أسرة حرة} \end{array}$$

- 1 - إذا كانت في أسرة B متوجهان متساوين فأن B تكون مقيدة
- 2 - إذا كانت أحدي متجهات أسرة B على شكل تأليف خطية للعناصر الأخرى فإن B تكون مقيدة
- 3 - إذا كانت أسرة B حرة فإن جميع عناصرها غير منعدمة و مختلفة مثنى مثنى

4 - أساس فضاء متجهي حقيقي:

a - تعريف :

ليكن $(E, +, \cdot)$ فضاء متجهي حقيقي

نقول أن أسرة $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ من متجهات E أساس للفضاء المتجهي $(E, +, \cdot)$ إذا وفقط إذا كانت كل متجهة من E تكتب بكيفية وحيدة على شكل تأليف خطية لمتجهات الأسرة B

بتعبير آخر :

$$\left(\forall \vec{x} \in E \right) \left(\exists! (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in IR^n \right) / \vec{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \Leftrightarrow E \text{ أساس للفضاء } B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$$

الأعداد الحقيقية α_1 و α_2 و ... و α_n تسمى إحداثيات المتجهة \vec{x} بالنسبة للأساس $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$

b - مثال :

في $(IR^3, +, \cdot)$ نعتبر المتجهات التالية : $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$ و $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$ و $\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$

لنبين أن الأسرة $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ أساس لفضاء المتجهي $(IR^3, +, \cdot)$

لتكن $\vec{x} = (a, b, c) \in IR^3$

$$\vec{x} = (a, b, c) = (a, 0, 0) + (0, b, 0) + (0, 0, c)$$

$$= a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1)$$

$$= a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3$$

نفترض أنه توجد أعداد حقيقة أخرى a' و b' و c' بحيث :

$$a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2 + c\vec{e}_3 = a'\vec{e}_1 + b'\vec{e}_2 + c'\vec{e}_3 \Rightarrow (a - a')\vec{e}_1 + (b - b')\vec{e}_2 + (c - c')\vec{e}_3 = (0, 0, 0)$$

$$(a - a')(1, 0, 0) + (b - b')(0, 1, 0) + (c - c')(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow (a - a', 0, 0) + (0, b - b', 0) + (0, 0, c - c') = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow (a - a', b - b', c - c') = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow a = a', b = b', c = c'$$

إذن كل متجهة من $(IR^3, +, \cdot)$ تكتب بكيفية وحيدة على شكل تالية خطية لمتجهات الأسرة

و وبالتالي $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ أساس لفضاء المتجهي $(IR^3, +, \cdot)$

c - خصائص :

ليكن $(E, +, \cdot)$ فضاء متجهي حقيقي

E أساس لفضاء $E \Leftrightarrow E$ أسرة مولدة وحرة لفضاء المتجهي	1
عدد متجهات الأساس B يسمى بعد الفضاء التجهي E ونرمز له بـ $\dim E$ ($\dim E = \text{card}(B)$)	
إذا كانت α_1 و α_2 و ... و α_n إحداثيات متجهة \vec{x} و β_1 و β_2 و ... و β_n إحداثيات متجهة \vec{y} فإن $(\vec{x} + \vec{y})$ و $\alpha_1 + \beta_1$ و $\alpha_2 + \beta_2$ و ... و $\alpha_n + \beta_n$ إحداثيات المتجهة	2
إذا كانت α_1 و α_2 و ... و α_n إحداثيات متجهة \vec{x} فإن إحداثيات المتجهة $\lambda\vec{x}$ هي : $\lambda\alpha_1$ و $\lambda\alpha_2$ و ... و $\lambda\alpha_n$	3
$\dim E = n \Rightarrow$ جميع أساسات E مكونة من n متجهة	4
$\det(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \neq 0 \Leftrightarrow (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ ($\dim E = 2$) أساس لفضاء E	5
$\det(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \neq 0 \Leftrightarrow (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ ($\dim E = 3$) أساس لفضاء $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$	6
E أساس لفضاء B' و $B \Rightarrow \text{card}(B) = \text{card}(B')$	7