

الاشتقاق و دراسة الدوال

1) اشتتقاق دالة في عدد : تعريف و تأويلات هندسية

$A(a, f(a))$ يقبل مماسا في النقطة (C_f) معامله الموجه $l = f'(a)$ و معادلته: $y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$	\leftrightarrow	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l \in \mathbb{R}$ $l = f'(a)$	\leftrightarrow	قابلة للاشتتقاق في a
$A(a, f(a))$ يقبل مماسا في النقطة (C_f) معامله الموجه $l = f_d'(a)$ و معادلته: $y = f_d'(a) \cdot (x - a) + f(a)$	\leftrightarrow	$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l \in \mathbb{R}$ $l = f_d'(a)$	\leftrightarrow	قابلة للاشتتقاق في a على اليمين
$A(a, f(a))$ يقبل مماسا في النقطة (C_f) معامله الموجه $l = f_g'(a)$ و معادلته: $y = f_g'(a) \cdot (x - a) + f(a)$	\leftrightarrow	$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l \in \mathbb{R}$ $l = f_g'(a)$	\leftrightarrow	قابلة للاشتتقاق في a على اليسار
$A(a, f(a))$ يقبل مماسا في النقطة (C_f) معامله الموجه $l = f'(a)$ و معادلته: $y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$	\leftrightarrow	f قابلة للاشتتقاق في a على اليمين f قابلة للاشتتقاق في a على اليسار $f_d'(a) = f_g'(a) = f'(a)$ ✓	\leftrightarrow	قابلة للاشتتقاق في a

• إذا كانت f قابلة للاشتتقاق في a على اليمين و f قابلة للاشتتقاق في a على اليسار و $f'(a) \neq f_g'(a)$ فـان f غير قابلة للاشتتقاق في a . في هذه الحالة (C_f) يقبل نصفي مماس مختلفان في النقطة $A(a, f(a))$ معاملاهما الموجهان $f_d'(a)$ و $f_g'(a)$ و النقطة $A(a, f_g(a))$ تسمى نقطة مزواة

• إذا كانت $f'(a) = 0$ فإن (C_f) يقبل مماساً أفقي في

$f \leftarrow \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$ غير قابلة للاشتاق في a على اليسار	$f \leftarrow \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty$ غير قابلة للاشتاق في a على اليمين
(C_f) يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأسفل في النقطة $A(f(a))$	(C_f) يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى في النقطة $A(f(a))$

2) اشتاق دالة على مجال

خاصيات

✓ إذا كانت f و g قابلتين للاشتاق على I و $\alpha \in \mathbb{R}$ فإن $\alpha \cdot f$ و $f + g$ و $f \times g$ قابلة للاشتاق على I
✓ بالإضافة إذا كانت $g \neq 0$ على I فإن $\frac{f}{g}$ قابلة للاشتاق على I
✓ إذا كانت f قابلة للاشتاق على I و $g \circ f$ قابلة للاشتاق على (I) فإن $g \circ f$ قابلة للاشتاق على I
✓ إذا كانت f قابلة للاشتاق على I و $f \geq 0$ على I فإن \sqrt{f} قابلة للاشتاق على I
✓ إذا كانت f قابلة للاشتاق على I فإن f^n ($n \in \mathbb{N}$) قابلة للاشتاق على I

الدالة المشتقة	الدالة
$\alpha \cdot f'$	$\alpha \cdot f$
$f' + g'$	$f + g$
$f' \times g + f \times g'$	$f \times g$
$-\frac{g'}{g^2}$	$\frac{1}{g}$
$\frac{f'g - fg'}{g^2}$	$\frac{f}{g}$
$f' \times g \circ f$	$g \circ f$
$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$	\sqrt{f}
$n f' f^{n-1}$	f^n
$\frac{U'}{U}$	$\ln U $
$U' e^U$	e^U

$\frac{U'}{1+U^2}$	$\text{Arc tan}(U)$
--------------------	---------------------

❖ مشتقات الدوال الاعتيادية

المجال I	الدالة المشتقة f'	الدالة f
\mathbb{R}	$x \mapsto 0$	$x \mapsto k$
\mathbb{R}	$x \mapsto nx^{n-1}$	$x \mapsto x^n \quad n \in \mathbb{N}^*$
$I =]-\infty, 0[\cup I =]0, +\infty[$	$x \mapsto nx^{n-1}$	$x \mapsto x^n \quad n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{-1\}$
$I =]0, +\infty[$	$x \mapsto rx^{r-1}$	$x \mapsto x^r \quad r \in \mathbb{Q}^* \setminus \{-1\}$
$I =]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \mapsto \sqrt{x}$
$I =]-\infty, 0[\cup I =]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{-1}{x^2}$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
\mathbb{R}	$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x$
\mathbb{R}	$x \mapsto -\sin x$	$x \mapsto \cos x$
$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z} \right\}$	$x \mapsto 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$x \mapsto \tan x$
$I =]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto \ln x$
\mathbb{R}	$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x$
\mathbb{R}	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \text{Arc tan}(x)$

خاصية : مشتقة الدالة العكسية :

لتكن f دالة معرفة على مجال I تقبل دالة عكسية f^{-1} و ليكن x_0 و y_0 عدنان بحيث :
إذا كانت $(f^{-1})'(x_0) \neq 0$ فإن f قابلة للاشتتقاق في x_0 ولدينا
إذا كانت ' f لا تندم على I فإن f قابلة للاشتتقاق على (I) ولدينا :
$(\forall x \in f(I)) \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(x)}$

- ✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) \geq 0$ فإن f تزايدية على I
- ✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) \leq 0$ فإن f تناظرية على I
- ✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) > 0$ فإن f تزايدية قطعاً على I
- ✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) < 0$ فإن f تناظرية قطعاً على I

- ✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) \geq 0$ وكانت f' تتعدم في عدد منته من النقط على I فإن f تزايدية قطعاً على I
- ✓ إذا كانت $\forall x \in I \quad f'(x) \leq 0$ وكانت f' تتعدم في عدد منته من النقط على I فإن f تناظرية قطعاً على I

(3) دالة الجذر من الرتبة n ($n \in \mathbb{N}^*$)

أ. تعريف:

ليكن n من \mathbb{N}^*
الدالة العكسية للدالة $x \mapsto x^n$ على المجال $[0, +\infty]$ تسمى دالة الجذر من الرتبة n و نرمز لها بـ $\sqrt[n]{x}$
الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ متصلة و تزايدية قطعاً على $[0, +\infty]$

ب. خصائص:

ليكن x و y عددين حقيقيين موجبان. لدينا:

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{x^m} &= \sqrt[n]{x^m} & \sqrt[n]{\sqrt[n]{x}} &= \sqrt[nm]{x} & \sqrt[n]{x^n} &= x & (\sqrt[n]{x})^n &= x \\ (y \neq 0) \quad \sqrt[n]{\frac{x}{y}} &= \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} & \sqrt[n]{x \cdot y} &= \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}\end{aligned}$$

ج. خصائص:

لتكن f دالة و $n \in \mathbb{N}^*$

- إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$
- إذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{l}$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ و $l \geq 0$
- إذا كانت f متصلة و موجبة على مجال I فإن $\sqrt[n]{f}$ متصلة على I

د. القوى الجذرية لعدد حقيقي:

ليكن n و m من N^* و $x > 0$ لدينا :

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} \quad \text{و} \quad \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$$

لكل عددين حقيقين موجبين قطعا x و y وكل r و r' من \mathbb{Q}^* :

$$\begin{array}{lll} (x^r)^{r'} = x^{r \cdot r'} & \bullet & x^r \cdot y^r = (x \cdot y)^r & \bullet & x^{r+r'} = x^r \cdot x^{r'} & \bullet \\ \frac{x^r}{x^{r'}} = x^{r-r'} & \bullet & \frac{x^r}{y^r} = \left(\frac{x}{y}\right)^r & \bullet & \frac{1}{x^r} = x^{-r} & \bullet \end{array}$$

خاصية

- ❖ الدالة $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n \sqrt[n]{x^{n-1}}}$ قابلة للاشتاقاق على $]0, +\infty[$ و لدينا :
- ❖ إذا كانت f قابلة للاشتاقاق على مجال I بحيث : $(\forall x \in I) \quad f(x) > 0$ فإن الدالة $\sqrt[n]{f}$ قابلة للاشتاقاق على I و لدينا :

4 دالة قوس الظل

تعريف

إذن f^{-1} متصلة و تزايدية قطعا على $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ تقبل دالة عكسية $f : \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$

x	\mapsto	$\tan x$
-----	-----------	----------

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

x	\mapsto	$\operatorname{Arc tan} x$
-----	-----------	----------------------------

الدالة $\operatorname{Arc tan}$ تسمى دالة قوس الظل

نتائج

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \left(\forall y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \right) \quad y = \text{Arc tan } x \Leftrightarrow x = \tan y$$

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) \quad \text{Arc tan } x < \text{Arc tan } y \Leftrightarrow x < y$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad \tan(\text{Arc tan}(x)) = x$$

$$\left(\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \right) \quad \text{Arc tan}(\tan(x)) = x$$

الدالة Arc tan دالة فردية

خواص

❖ الدالة Arc tan قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} ولدينا

❖ إذا كانت U دالة قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $\text{Arc tan}(U)$ قابلة للاشتقاق على I ولدينا :

$$(\text{Arc tan}(U))' = \frac{U'}{1+U^2}$$