

ملخصى وقواعدى فى الرياضيات

مستوى: السنة الثانية من سلك البكالوريا

- شعبة التعليم الأصيل: مسلك العلوم الشرعية و مسلك اللغة العربية
- شعبة الآداب و العلوم الإنسانية: مسلك الآداب و مسلك العلوم الإنسانية

ملخص درس المتتاليات الترجعية:

II. متتالية هندسية

- لكي نبين أن متتالية هندسية حسب: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ العدد q الذي نجده هو الأساس و $u_n = u_0 \times q^n$ هي الكتابة بدلالة n
 - إذا كانت (u_n) متتالية هندسية أساسها q غير منعدم وحدتها الأول u_0 فان: $u_n = u_0 q^{n-0}$
 - إذا كانت (u_n) متتالية هندسية أساسها q غير منعدم وحدتها الأول u_1 فان: $u_n = u_1 q^{n-1}$
 - وبصفة عامة: $u_n = u_p q^{n-p}$
 - مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية أساسها q $(u_n)_{n \in I}$
- $$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) \text{ هو } q \neq 1$$
- مثال:** $S_1 = u_4 + u_5 + \dots + u_{30} = u_4 \frac{1 - q^{30-4+1}}{1 - q}$

I. متتالية حسابية

- لكي نبين أن متتالية حسابية حسب: $u_{n+1} - u_n = r$ العدد r الذي نجده هو الأساس و $u_n = u_0 + nr$ هي الكتابة بدلالة n
 - إذا كانت (u_n) متتالية حسابية أساسها r وحدتها الأول u_1 فان: $u_n = u_1 + (n-1)r$
 - وبصفة عامة: $u_n = u_p + (n-p)r$
 - مجموع حدود متتابعة لمتتالية $(u_n)_{n \in I}$ حسابية:
- $$n > p \geq n_0 \quad S_n = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_n$$
- $$S_n = (n-p+1) \left(\frac{u_n + u_p}{2} \right) \text{ هو ملاحظة: } S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = (n+1) \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right)$$
- أمثلة:** $S_1 = u_3 + u_4 + u_5 + \dots + u_{30} = (30-3+1) \frac{u_3 + u_{30}}{2}$
- $$S_2 = u_7 + u_8 + u_9 + \dots + u_{25} = (25-7+1) \frac{u_7 + u_{25}}{2} = (19) \frac{u_7 + u_{25}}{2}$$

(2) أحسب v_{n+1} و استنتاج طبيعة المتتالية (v_n)

(3) أكتب v_n بدلالة n

(4) استنتاج u_n بدلالة n

الجواب: نعرض n بـ 0

$$u_{0+1} = 2 \times u_0 + 2 = 2 \times 2 + 3 = 4 + 3 = 7 \quad \text{فوجد: } u_1 = 7$$

اذن: نعرض n بـ 1 فوجد:

$$u_{1+1} = 2 \times u_1 + 2 = 2 \times 7 + 2 = 14 + 2 = 16$$

اذن: $u_2 = 16$

نعرض n بـ 0 فوجد: $v_0 = u_0 + 2 = 2 + 2 = 4$

نعرض n بـ 1 فوجد: $v_1 = u_1 + 2 = 7 + 2 = 9$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} + 2}{u_n + 2} = \frac{2u_n + 2 + 2}{u_n + 2} = \frac{2u_n + 4}{u_n + 2} = \frac{2(u_n + 2)}{u_n + 2} = 2 = q \quad (2)$$

اذن: المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = 2$ وحدتها الأول 4

(3) كتابة v_n بدلالة n

بما أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = 2$ وحدتها الأول 4

فإن: $v_n = v_0 \times q^n$ أي: $v_n = 4 \times 2^n$

(4) استنتاج u_n بدلالة n : لدينا: $v_n = u_n + 2$

اذن: $u_n = 4 \times 2^n - 2$ أي: $v_n - 2 = u_n$

III. المتتاليات من صنف

مثال 1: نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بالعلاقة الترجعية

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$$

أحسب الحدود الأربع الأولى للمتتالية (u_n)

الجواب: نعرض n بـ 0 فوجد: $u_0 = 2 \times u_0 + 3 = 2 \times 1 + 3 = 2 + 3 = 5$

اذن: $u_1 = 5$

: فوجد $u_{1+1} = 2 \times u_1 + 3 = 2 \times 5 + 3 = 10 + 3 = 13$

اذن: $u_2 = 13$

: فوجد $u_{2+1} = 2 \times u_2 + 3 = 2 \times 13 + 3 = 26 + 3 = 29$

اذن: $u_3 = 29$

ملاحظة: هذه المتتالية تسمى متتالية ترجعية

مثال 2: نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة كالتالي:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + 2 \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

ونعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة كالتالي :

$$\forall n \in \mathbb{N}$$

أحسب u_1 و u_2 و v_0 و v_1 و